



1. Les comprimés à libération accélérée:

- effervescents, lyoc, dispersibles, ils agissent en 15 à 30 minutes : ces formes galéniques peuvent être
- comprimés sublinguaux, muco-gingivaux, à sucer, adhésif buccal: ne pas écraser, ni croquer.

2. Les comprimés à libération modifiée :

La forme galénique permet grâce à une modification des conditions de l'absorption digestive de libérer le principe actif à un moment ou un lieu de l'organisme différent. **Ces formes galéniques ne peuvent pas**
En revanche , si le comprimé est sécable, il peut être coupé.

- forme à libération prolongée : principe actif libéré de sa forme galénique sur une période de temps plus ou moins longue ,permettant de réduire le nombre de prises quotidiennes.
- forme gastro-résistante : principe actif libéré dans un autre lieu que l'estomac.

LP: Libération Prolongée, LM: Libération Modifiée, LR: Libération Retardée

3. Les capsules molles

Elles contiennent un liquide : ne doivent pas être écrasées, ni coupées.

4. Les cytotoxiques par voie orale

En raison de leur toxicité, il est interdit d'écraser les comprimés ou d'ouvrir les gélules.

Couper, écraser ou ouvrir une gélule : oui ou non ? Pourquoi est-ce éventuellement dangereux?

- * Risque de toxicité locale pour le manipulateur
- * Risque de modification de l'absorption: risque de sous ou sur dosage
- * Risque de destruction du médicament (perte d'effet)

En pratique :

Vérifier si le médicament ne peut être remplacé par une autre forme galénique (solution buvable, sachet, comprimé dispersible...) **ou une autre spécialité** (avec accord du médecin ou de la sous-

Vérifier si le médicament peut être écrasé ou ouvert en se référant à la liste régionale.

La modification de la forme galénique, selon les recommandations figurant sur la liste régionale, **est**

Respecter les règles d'hygiène des mains: lavage des mains ou friction avec un produit hydro alcoolique avant et après manipulation, **nettoyage du matériel utilisé** pour écraser entre chaque utilisation ou Mettre des gants et un masque dans la mesure du possible (risque d'inhalation du produit).

L'administration après ouverture des gélules ou broyage des comprimés doit toujours se faire immédiatement pour éviter toute altération du principe actif (les principes peuvent être instables à l'air, à

Ecraser les comprimés le plus finement possible.

Eviter de mélanger les médicaments entre eux à cause du risque d'interaction. **Administer les**

Eviter d'utiliser un récipient intermédiaire entre l'écrasement et le transfert dans la substance-véhicule. Sinon, en utiliser un sans relief, avec le nom du patient et du médicament.

Utiliser un véhicule pour l'administration des médicaments le plus neutre possible (eau).



Utiliser une seringue par temps d'administration.

Pour une administration par sonde, penser à rincer la sonde avant le début de l'administration et après le passage de chaque médicament. Vérifier que la granulométrie du comprimé écrasé est

Attention aux formes orodispersibles : certains médicaments dissous dans l'eau bouchent les sondes (ex :

Respecter les horaires d'administration par rapport aux repas.

Cette liste régionale est à adapter au livret thérapeutique de votre établissement et à valider par la sous-commission de la CME chargée de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux (COMEDIMS ou équivalent). Elle sera remise à jour régulièrement.
 S'il vous manque des informations ou si vous avez besoin d'administrer un médicament non listé, **contactez la pharmacie de votre établissement.**

Afin de construire cette liste régionale, les documents élaborés par les établissements de notre région ou d'autres régions datant de 2003 à 2010 ont été recensés.

11 listes parmi les plus récentes ont finalement été prises en compte et ont fait l'objet d'une confrontation ligne à ligne afin de vérifier leur concordance ou de détecter des discordances. En cas d'avis divergent sur un médicament ou d'un médicament mentionné dans une seule liste, les différents laboratoires ont été contactés afin de recueillir leurs recommandations écrites.

Au total, 713 spécialités ont été répertoriées, correspondant aux formes princeps majoritairement. Le document régional mentionne le nom de la spécialité et la forme galénique, les recommandations d'ouverture et de broyage sous formes de pictogrammes, les alternatives proposées et un niveau de preuve indiquant le nombre de sources concordantes sur le nombre total de sources ainsi que les données transmises par les laboratoires.

Pour certaines spécialités, aucun pictogramme n'est proposé puisque les listes n'étaient pas toutes concordantes et que le laboratoire ne nous a pas permis de trancher : les éléments à notre disposition sont néanmoins écrits et la décision quant à un broyage possible ou une ouverture possible sera à prendre en interne dans l'établissement.

Légende:



Dissolution possible dans de l'eau (= D)



Ne pas ouvrir les capsules (= C)



Ne pas ouvrir les gélules (= NO)



Ouverture possible des gélules (=O)



Ne pas écraser les comprimés (= NE)



Ecrasement possible des comprimés (= E)

Les lettres D; C; NO; O; NE; E correspondant chacune à une recommandation sont dissimulées derrière chaque image afin de vous permettre de réaliser des tris par type de recommandations. Par exemple : si vous recherchez toutes les spécialités dispersibles vous pouvez faire un tri dans la colonne recommandations en affichant tous les "D".

Spécialité	Formes galéniques	Recommandations	Remarque, explication	Alternative	Pertinence	Commentaire labo
Abilify 10 et 15mg	Comprimé orodispersible		Laisser fondre sous la langue ou dans un verre d'eau	-	3 oui/3 + labo	Possibilité de la dissoudre dans l'eau et de boire la suspension
Abilify 5mg, 10 et 15mg	Comprimé			Forme orodispersible	2 oui/4 + labo	Pas d'écrasement ni de sécabilité mentionnés dans l'AMM
Actifed rhume	Comprimé		D'après le RCP "à avaler tel quel avec une boisson (eau, lait, jus de fruit)"		1 non/1 + labo	Dans l'absolu : oui mais on ne peut pas garantir l'absence d'interactions entre le comprimé écrasé et le support dans lequel on ajoute le cp écrasé. Il n'y a pas de problème si le support utilisé est de l'eau.
Actiskenan 5mg, 10mg, 20mg et 30mg	Gélule		Stupéfiants. Ne pas écraser les granules. Mélanger avec aliment semi solide (compote) Ne pas croquer. A administrer à distance des repas. Ne pas s'allonger dans les 30 min suivant la prise. Ne pas administrer le comprimé écrasé sans sonde car risque d'oesophagite	-	10 oui/10	
Actonel 5mg et 35mg	Comprimé pelliculé			Protelos 2g, granulés pour susp buv en sachet	6 non/6	
Actos 15 mg et 30 mg	Comprimé		Retrait de commercialisation		3 oui/4 + labo	Absence d'étude mais galénique ne s'opposant pas : cp non gastrorésistant et non LP
Acuilix 20mg/12,5 mg	Comprimé pelliculé sécable			Autre IEC+ diurétique: Zestoretic comp	1 non/1 + labo	Aucune étude
Acuitel 5 et 20 mg	Comprimé enrobé sécable			Autre IEC: Zestril 20mg comp	1 non/1 + labo	Aucune étude n'a été menée pour évaluer la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance des cps écrasés ou pilés puis mélangés dans de l'eau ou dans d'autres diluants (compote de pomme, autres aliments). Donc pas de recommandations de la part du laboratoire.
Adalate 10mg	Capsule molle		Ne pas ouvrir, Ne pas croquer, Principe actif photosensible à Administration immédiate. Prise à distance des repas.	Nifedipine 1mg/0,4ml, sol buv en goutte	2 non/3 + labo	aucune étude pour confirmer que la pharmacocinétique serait inchangée
Adalate LP 20mg	Comprimé à libération prolongée		Prise à distance des repas	Nifedipine 1mg/0,4ml, sol buv en goutte	2 non/2 + labo	non
Adancor 10mg, 20mg	Comprimé sécable			-	6 oui/6 + labo	Il est possible de broyer les cp, cependant n'ayant pas de données de stabilité après broyage, ceci est à faire de manière extemporanée
Adiazine 500mg	Comprimé			-	3 oui/3	
Adroavance 70mg/2800 UI et 70mg/5600 UI	Comprimé		PA irritant pour les muqueuses buccales et oesophagiennes		2 non/2	
Aérius	Comprimé pelliculé		Avaler le comprimé avec de l'eau au moment ou en dehors des repas.	Aerius 0.5mg/ml, sirop, fl. de 150ml	3 oui/6 + labo	L'écrasement est possible et la poudre peut être administrée dans la sonde entérale. Cp pelliculé afin de masquer le goût, Il existe une alternative par une solution buvable.
Akineton LP 4 mg	Comprimé pelliculé à libération prolongée			Autre Anticholinergique Antiparkinsonien: Artane buvable	5 non/5	
Aldactazine 25mg/15mg	Comprimé enrobé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas. Eviter l'administration en fin de journée.	-	6 oui /8+ labo	Aucune étude n'a été menée donc le labo n'a pas de recommandation à proposer
Aldactone 25, 50 et 75 mg	Comprimé pelliculé sécable		Goût très désagréable Mettre en suspension dans un liquide.		8 oui/8 + labo	Possibilité d'administrer en suspension dans un liquide (sirop ou solution de méthyl-cellulose) des cp de 25mg pour les enfants de moins de 6 ans. Pas d'étude cliniques menées avec des cp broyés mis en gélules.
Aldalix 50 mg/20 mg	Gélule			Spironolactone+ Diurétique hypokaliémiant: Aldactazine comp	1 non/2 + labo	Aucune étude n'a évalué la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance après ouverture donc le labo n'a pas de recommandation à proposer
Aldomet 250mg et 500mg	Comprimé pelliculé		Principe actif photosensible à Administration immédiate	-	2 oui/2	
Alepsal 15, 50, 100 et 150 mg	Comprimé		mélanger avec un aliment Très dur à écraser		2 oui/2	
Alkeran 2mg	Comprimé pelliculé		Produit cytotoxique Ne pas croquer	-	3 non/3	

Alkonatrem	Gélule		La poudre peut être mélangée à des aliments pour l'administration		1 oui/2 + labo	ouverture possible
Allopurinol 100mg, 200, 300 mg	Comprimé		Administrer avec boisson ou aliment	-	4 oui/4 + labo	oui
Alpress LP 2,5mg et 5mg	Comprimé LP osmotique		D'après le RCP ne pas casser, ni broyer, ni mâcher	Autre alpha 1 bloquant: Eupressyl 30mg ou 60mg ou Minipress 1mg et 5mg, comprimé	6 non/6	
Altéis 20mg	Comprimé pelliculé		-	autres sartans: Atacand, Aprovel	1non/1 +labo	Absence d'étude de biodisponibilité donc non recommandé par le labo
Amarel 1, 2, 3 et 4 mg	Comprimé		D'après le RCP "les cps sont à avaler entiers avec un peu de liquide."		5 oui/5	
Amlor 5mg et 10mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu	-	9 oui/9 + labo	Etude ayant montré une absorption similaire entre la prise sous forme de gélule ou en solution dans l'eau distillée mais l'emploi par une voie d'administration autre que l'AMM est non préconisé par le labo
Amox-ac clavulanique 500mg /62,5mg	Comprimé pelliculé		De préférence en début de repas	Augmentin 500/62,5mg, susp buv, sachet	7 non/7 + labo	interdit d'écraser les comprimés
Anafranil 10 et 25mg	Comprimé enrobé				3 oui/5 + labo	Si aucune autre alternative n'est possible et que l'état du malade le nécessite seules les formes Cp enrobés à 25 ou 10 mg peuvent être écrasées
Anafranil 75mg	Comprimé pelliculé sécable			utiliser Anafranil 10 ou 25 mg	5 non/5 + labo	Risque de modifier la pharmacocinétique car cp pelliculé à matrice
Anandron 150 mg	Comprimé				2 oui/2	
Anausin métoclopramide LP 15mg	Comprimé à libération prolongée		Forme LP. Ne pas croquer, ne pas écraser		1 non/1	pas d'info labo mais forme LP
Ancotil 500mg	Comprimé sécable				1 oui/1	Le labo ne peut recommander le fait de broyer les comprimés, dans la mesure où cela n'est pas validé par leur AMM. Néanmoins dans les cas exceptionnels où il est impossible de faire autrement, il est alors important d'éviter les phénomènes d'échauffement lors du broyage. De plus, ne disposant pas de donnée de stabilité dans ces conditions, il convient de ne pas réaliser ces préparations à l'avance, et d'éviter toute contamination.
Androcur 50mg et 100mg	Comprimé sécable		-	-	7 oui/7+labo	
Ansapipine 150mg	Gélule		-	-	2 oui/2 + labo	Pas de données concernant l'ouverture des gélules. Si l'administration par voie orale de la forme galénique modifiée est envisagée, seule une faible différence de la pharmacocinétique et de l'absorption de l'Ansapipine devrait être observée, le site d'absorption restant le même. L'ouverture des gélules devra cependant être réalisée juste avant l'administration, car pas de données de stabilité dans ces conditions d'utilisation. La rifabutine étant difficilement soluble dans l'eau, mélanger la poudre avec un aliment (ex: compote de pomme).
Aotal 333mg	Comprimé gastro-résistant		A jeun	-	9 non/9	
Apranax 550 et 750mg	Comprimé enrobé (sécable uniquement pour le 550mg)		A administrer au cours ou en fin de repas. Goût très amer, irritation de la gorge.	Apranax 500mg, granulés pour susp buv, sachet	2 non/3+labo	Aucune étude car existe une forme buvable
Aprovel 75mg, 150mg et 300mg	Comprimé pelliculé		-	-	7 oui/8 +labo	pas dans l'AMM mais rien ne s'oppose d'un point de vue galénique mais aucune donnée de bioéquivalence ou de stabilité
Aptivus 250mg	Capsule molle		Produit cytotoxique Ne pas croquer	-	1 non/1 + labo	Contient une solution liquide et huileuse. Ne pas ouvrir les capsules.
Arava 20 et 100mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	-	2 non/2 + labo	Aucune étude, PA toxique (toxicité limitée par l'enrobage) et très sensible à l'humidité
Arcalion	Comprimé enrobé				labo	peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Arestal 1mg	Comprimé			Préférer Imodium susp buvable ou lyc	1 oui/1 + labo	Pas d'étude de biodisponibilité donc on ne peut prévoir son efficacité après écrasement bien qu'il s'agisse d'un cp nu sans enrobage.
Aricept 5mg et 10mg	Comprimé orodispersible		A placer sur la langue avec ou sans eau	-	5 oui/5	
Aricept 5mg, 10 mg	Comprimé pelliculé			Préférer les comprimés orodispersibles	3 oui/3	















Arimidex 1 mg	Comprimé pelliculé		Ne pas fumer, ne pas manipuler par femme enceinte. Se protéger avec gants et masque; Adm. aussitôt après écrasement		3 oui/5 + labo	Pas de données de pharmacocinétique mais forme galénique simple, il semble probable qu'il ne devrait pas y avoir de modification majeure des paramètres pharmacocinétiques. Administration extemporanée, Ne pas faire manipuler le produit par une femme enceinte, Se protéger avec des gants et masque
Aromasine 25 mg	Comprimé enrobé				3 non/3	
Art 50mg	Gélule				1 non/1 + labo	Pas recommandé d'ouvrir la gélule car aucune étude n'a été faite. De plus, la diacéréine est un produit potentiellement irritant (protection des muqueuses buccale et oesophagienne par la gélule).
Artane 2mg et 5mg	Comprimé		-	Artane 0.1mg/gtte, sol buv en gouttes, fl. de 30ml	3 non/3	
Artex	Comprimé enrobé sécable		administration immédiate		1 oui/1 + labo	peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Arthrocline 100 et 200 mg	Comprimé (sécable pour le 200mg)		D'après le RCP "les cps sont à avaler tels quels, avec un grand verre d'eau, au cours du repas"		1 non/1 + labo	Pas d'études réalisées. Mais ça ne semble pas poser de problème car le cp est à libération immédiate et non pelliculé.
Artotec 50 mg	Comprimé gastro-résistant			Autre AINS: Apranax sachet, Feldene 20mg etc...	1 non/1	pas d'info labo mais cp gastro-résistant donc impossible
Asasantine LP 200mg/25mg	Gélule		Ne pas écraser les microgranules LP	-	4 oui/6 + labo	Pas de données concernant la cinétique et l'efficacité clinique. Toutefois, les microgranules ne doivent pas être écrasés.
Atacand 4mg, 8mg et 16mg	Comprimé sécable		-	-	8 oui/8	
Atarax 25 et 100 mg	Comprimé pelliculé sécable			goût amer, utilisation préférable de la solution buvable, alternative : Lexomil, Xanax	6 oui/8 + labo	Possible même s'il existe une alternative par un sirop buvable
Athymil 10, 30 et 60 mg	Comprimé pelliculé (sécable pour le 60 mg)		Utiliser rapidement, effet anesthésique de contact. A avaler sans croquer	Laroxyl gouttes	6 oui/7 + labo	L'ecrasement est possible
Avlocardyl 40mg	Comprimé sécable		prise pendant le repas	-	8 oui/8	
Avlocardyl LP 160mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu (microgranules gastroresistantes)	-	6 oui/8 + labo	Résistance possible au moment de l'ouverture car la fermeture de la gélule est verrouillée pour freiner l'ouverture inappropriée. Pas d'étude garantissant une pharmacocinétique identique (des microgranules peuvent être retenues dans l'oesophage voire dans la sonde si administration dispersée).
Azadose 600mg	Comprimé pelliculé		-	-	1 oui/1 + labo	Les cps doivent être avalés ou écrasés pour les patients présentant des difficultés à la déglutition.
Azantac 150mg et 300mg	Comprimé pelliculé		Principe actif photosensible à Administration immédiate	Utiliser l'injectable en buvable ou les comprimés effervescents	2 non/3+labo	Le labo déconseille d'écraser les comprimés car PA photosensible.
Bactrim 400mg/80mg et Bactrim forte 800mg/160mg	Comprimé (sécable pour le 400mg/80mg)		Administrer en cours ou à la fin du repas	Bactrim 100 ml suspension buvable	6 non/10 + labo	Aucune étude car alternative par une suspension buvable
Baraclude 0,5 et 1 mg	Comprimé pelliculé			solution buvable 0,05 mg/ml fl de 210 ml	labo	Aucune donnée sur bioéquivalence ni sur la stabilité de l'unité thérapeutique à l'état de poudre. Rien ne s'oppose à les couper et/ou les écraser, Toute modalité d'utilisation non validée par AMM est sous la responsabilité des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge thérapeutique,
Basdene 25mg	Comprimé		-	-	2 oui/2	
Baypress 10 et 20 mg	Comprimé				1 non/1 + labo	pas d'infos
Becilan 250mg	Comprimé sécable		-	-	2 oui/2	
Befizal 200mg	Comprimé pelliculé				1 oui/1 + labo	Les comprimés de BEFIZAL 200mg peuvent être écrasés. Comme aucune étude n'a été réalisée, l'administration de comprimés écrasés relève de la seule responsabilité de l'administrateur.

Befizal LP 400mg	Comprimé enrobé à libération prolongée			BEFIZAL 200mg cp pelliculé	1 non/1 + labo	les cps de BEFIZAL LP 400mg ne peuvent pas être écrasés. En effet, il s'agit d'une forme à libération prolongée.
Belustine 40mg	Gélule		Produit cytotoxique	-	2 non/2	
Benemide 500mg	Comprimé sécable		-	-	3 oui/3	
Betahistine 8mg	Comprimé		D'après le RCP "les Cps doivent être avalés sans être croqués avec un verre d'eau au cours du repas".	-	6 oui/6+labo	oui
Bevitine 250mg	Comprimé pelliculé		D'après le RCP "avaler, sans croquer, les cps avec un peu d'eau"	-	3 oui/3	
Biltricide 600mg	Comprimé pelliculé quadrisécable		Se désagrège dans l'eau Ne pas croquer. Ne pas écraser		3 oui/3	
Bipreterax	Comprimé pelliculé				4 oui/4 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Bi-profenid 150mg	Comprimé sécable		-	Profenid 100mg, suppositoire ou autre AINS	7 non/7	
Birodogyl	Comprimé pelliculé				1 oui/1 + labo	Les cps ne sont pas gastro-résistants, ils est donc possible de les écraser pour une administration par sonde entérale. Cependant il n'y aucune étude spécifique réalisée avec les cps écrasés ni par sonde. Pas de garantie que les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, ainsi que la tolérance, restent inchangés lors de l'administration de cps écrasés.
Bi-tildiem LP 90mg et 120mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicornium	7 non/7 + labo	Ne doivent pas être broyées car leur présentation galénique particulière est conçue pour une LP
Brexin 20 mg	Comprimé effervescent		A administrer au cours du repas, Dissoudre dans l'eau,	-	2 oui/2	
Brexin 20 mg	Comprimé sécable				2 non/2	
Bricanyl LP 5mg	Comprimé à libération prolongée		Ne pas croquer. A administrer au cours ou en fin de repas	autre beta-stimulant : Oxeol 10mg et 20mg - Ventoline buvable - Salbumol suppo	9 non/9	
Briem 5mg et 10mg	Comprimé enrobé sécable		-	Cibacene 5mg et 10mg, comprimés	2 non/3 + labo	Risque de modifier la pharmacocinétique et plus précisément la biodisponibilité
Bristopen 500mg	Gélule			Poudre pour sirop à 250-mg/5 ml - Flacon de 60 ml (1-cmesure=250mg)	1 non/1	pas d'info-labo mais il existe une-alternative par un sirop
Bromokin 2mg et 5mg	Comprimé sécable		A administrer au cours du repas	-	4 oui/4	
Buflomedil 150 mg	Comprimé pelliculé		-	-	5 oui/6 + labo	Il n'existe aucune donnée permettant d'écraser les cps.
Buprenorphine 0,4mg, 2mg et 8mg	Comprimé sublingual		Laisser fondre le comprimé sous la langue	-	3 non/3+labo	Produit détruit par effet de premier passage hépatique lorsqu'il est administré par voie orale. Seule la voie sublinguale en laissant fondre sous la langue est adaptée et validée
Burinex 1 et 5 mg	Comprimé sécable		administration immédiate car photosensible	-	9 oui/9	
Buspar 10mg	Comprimé sécable		ne pas administrer avec du jus de pamplemousse	-	8 oui/8+labo	oui
Caltrate 600mg	Comprimé pelliculé		A prendre à distance des repas		1 oui/1 + labo	Les comprimés peuvent être écrasés sans problème
Caltrate vit D3 600mg/400UI	Comprimé pelliculé				1 oui/1 + labo	Les comprimés peuvent être écrasés sans problème
Captea 50mg/25mg	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	aucune étude
Captopril 25mg et 50mg	Comprimé sécable		-	-	2 oui/2 +labo	Aucune donnée ne permettant d'écraser les cps ou ouvrir les gélules
Carbolevure	Gélule				1 non/2 + labo	Risque de modifier la pharmacocinétique et plus précisément la biodisponibilité
Cardensiel 1,25 - 2,5 - 3,75 - 5 - 7,5 - 10 mg	Comprimé pelliculé		D'après le RCP "ne doivent pas être machés"	autres bêta-bloquants sans ASI : Tenormine, Detensiel, Seloken	5 oui/10 + labo	Gout amer masqué par le pelliculage, Administration extemporanée

RCP du 19/07/2011

RCP du 20/05/2011

Retrait forme gélule et sirop 23/05/2011 Afssaps













Casodex 50mg	Comprimé enrobé		 Ne pas manipuler chez la femme enceinte. Protection par gants et masque. Adm. extemporanée après mise en suspension car risque de formation de cristaux.		2 oui/5 + labo	Pas d'étude mais ce n'est ni une forme LP ni gastrorésistante, Administration extemporanée car risque de formation de cristaux après mise en suspension, Ne pas faire manipuler le produit par une femme enceinte, Se protéger avec des gants et masque,
Catapressan 0,15 mg	Comprimé sécable			Autres antihypertenseurs d'action centrale : Aldomet, Hyperium	3 non/6 + labo	pas recommandé d'écraser le comprimé car aucune étude n'a été réalisée
Cebutid 50mg et 100mg	Comprimé pelliculé		D'après le RCP "les cps sont à avaler tels quels sans les croquer, avec un verre d'eau, de préférence au cours d'un repas".	-	2 oui/2	
Celebrex 200mg	Gélule				3 oui/4 +labo	Aucune étude n a été menée sur l'ouverture des gélules donc le labo n'a pas de recommandation à proposer
Celestamine 0,25mg/2mg	Comprimé			celestene 0,05% solution buvable + polaramine 0,01% sirop	labo	existence d'une alternative celestene + polaramine en solution buv
Celestene 2 mg	Comprimé dispersible sécable		prise à la fin du repas	CELESTENE 0,05% sol buv	1 non/2	pas d'info labo mais existence d'une alternative
Celiprolol 200mg	Comprimé enrobé sécable	 uniquement si administration par SNG	Administration uniquement par sonde naso-gastrique Administrer de préférence le matin avec un liquide à jeun. Ne doit pas être en contact avec la muqueuse buccale	SECTRAL 40mg/ml 125 ml solution buvable *	5 oui/7+labo	Pas de contact avec les muqueuses, Administration uniquement par sonde nasogastrique
Cellcept 250mg	Gélule		Ne pas ouvrir la gélule, Administrer au cours ou en dehors des repas	Cellcept 1g/5ml, poudre pour suspension buvable	4 non/4 + labo	Etant donné que le mycophénolate mofétil a un effet tératogène chez le rat et le lapin, le RCP précise "qu'il ne faut pas écraser les cps ni ouvrir ou écraser les gélules de Cellcept", Il existe une alternative Cellcept poudre pour suspension buvable (qui peut être administré par un tube nasogastrique d'un diamètre mini de 8 French (soit 1,7 mm)),
Cellcept 500mg	Comprimé pelliculé		Ne pas écraser, Administrer au cours ou en dehors des repas	Cellcept 1g/5ml poudre pour suspension buvable	labo	Etant donné que le mycophénolate mofétil a un effet tératogène chez le rat et le lapin, le RCP précise "qu'il ne faut pas écraser les cps ni ouvrir ou écraser les gélules de Cellcept", Il existe une alternative Cellcept poudre pour suspension buvable (qui peut être administré par un tube nasogastrique d'un diamètre mini de 8 French (soit 1,7 mm)),
Celltop 25, 50 et 100mg	Capsule molle				1 non/1	pas d'info labo mais impossible car capsule (contenu liquide huileux)
Ceris 20mg	Comprimé enrobé		Goût très amer. A avaler avec un grand verre d'eau, à jeun.		1 non/1 + labo	Ne pas écraser, prendre le comprimé en entier
Cervoxan 60 mg	Gélule				1 non/1 + labo	En l'absence de donnée de stabilité, il est conseillé de ne pas les ouvrir
Chibro-proscar 5 mg	Comprimé pelliculé		 Pas de manipulation par la femme enceinte,		7 oui/8 + labo	L'administration après écrasement serait en dehors du mode d'administration de l'AMM. Aucune étude n'est disponible à ce jour. Néanmoins si cette manipulation doit impérativement être effectuée en vue d'une administration par sonde, il faut mettre en suspension le comprimé au moment de l'administration au malade. Une femme enceinte ou en âge de procréer, ne doit jamais manipuler des comprimés écrasés ou cassés (peut entraîner des anomalies des organes génitaux externes chez le fœtus mâle).
Chloraminophène 2mg	Gélule		produit cytotoxique 		1 non/1	pas d'info labo mais ne pas ouvrir car produit cytotoxique
Chondrosulf 400mg	Gélule		D'après le RCP "les gélules sont à avaler telles quelles avec un grand verre d'eau".	Chondrosulf Granulés pour suspension buvable à 400 mg (sachets)	1 oui/1	pas d'info labo mais alternative possible par une forme buvable

RCP du 26/042006

RCP du 21/05/2010

Chronodalate LP 30 mg	Comprimé osmotique pelliculé		Forme LP, à avaler sans croquer.	Autre inhibiteur calcique: Amlor gélule, Isoptine 40mg etc...	4 non/4	
Cibacene 5mg et 10mg	Comprimé pelliculé		-	-	1 oui/1	Le labo ne peut recommander le fait de broyer les cps, dans la mesure où cela n'est pas validé par l'AMM. De plus, il peut se produire des phénomènes de surchauffe du cp. Le labo ne dispose pas d'éléments de stabilité et ne peut garantir la stabilité des préparations.
Cipralan 130 mg	Comprimé sécable			Autre antiarythmique: Flécaine 100mg, Rythmol 300mg etc...	3 non/3	
Ciflox 250mg, 500mg et 750mg	Comprimé pelliculé			-	7 oui/7+labo	Validé à l'AMM, Chez les patients sous SNG le cp peut être administré par cette voie après broyage à jeun ou au cours d'une alimentation entérale sans modification de la biodisponibilité par rapport à la forme intacte
Clamoxyl 500 mg	Gélule		-	Clamoxyl 500mg/5ml, poudre pour susp buv	2 non/6 + labo	L'amm indique que les gélules doivent être avalées sans les ouvrir donc le labo ne recommande pas l'ouverture. Pas d'étude.
Clamoxyl 1 g	Comprimé dispersible		Disperser dans un verre d'eau avant la prise. Administrer avant, pendant ou après le repas.	Clamoxyl 1g, susp buv en sachet	4 oui/4	
Clarityne 10mg	Comprimé			Forme buvable, cp effervescent	2 non/2	
Clastoban 800mg	Comprimé pelliculé sécable		Laisser fondre le comprimé dans un verre d'eau, le matin à jeun.	-	2 oui/2 +labo	Recommandé de les laisser fondre dans un verre d'eau plutôt que de les écraser (le délitement n'est pas immédiat)
Cléridium 150 mg	Comprimé pelliculé sécable		Trop petit pour être écrasé		1 non/1 + labo	Aucune donnée sur les cps écrasés
Clopixol 10 et 25mg	Comprimé pelliculé			CLOPIXOL 2 % solution buvable	2 non/2	
Coaprovel 150 et 300 mg	Comprimé pelliculé				4 oui/4	
Colchicine 1 mg	Comprimé		A administrer au cours du repas. Goût amer, à administrer très rapidement, mélanger à de la compote	-	8 oui/8	
Colchimax 1mg / 12,5mg / 50mg	Comprimé pelliculé				8 oui/8	
Colimycine M UI 1,5	Comprimé		Les comprimés peuvent être avalés ou dilués dans de l'eau en raison de leur solubilité.		1 oui/1 + labo	Dans la mesure où Colimycine a une formulation à libération immédiate, les cps peuvent être pulvérisés sans risque THEORIQUE de modifier la biodisponibilité. Cependant il n'y a aucune donnée pharmacocinétique sur ce mode d'administration qui ne fait pas partie de l'AMM
Coltramyli 4 mg	Comprimé				labo	Aucune donnée relative aux cps écrasés, Ne peuvent pas garantir les paramètres pharmacocinétiques pharmacodynamiques et la tolérance, Néanmoins d'un point de vue galénique le cp peut être écrasé et pris de façon extemporanée
Combivir 150mg/300mg	Comprimé pelliculé sécable		à jeun de préférence	Epivir 10mg/ml, sol buv, fl. de 240ml + Retrovir 10mg/ml, susp buv, fl. de 200ml	4 non/5 + labo	Les cps doivent être idéalement avalés sans les écraser, afin de garantir l'administration de la dose complète, Néanmoins, pour les patients dans l'incapacité d'avaler des comprimés, ils peuvent être écrasés et mélangés à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide, le tout devant être ingéré immédiatement, Cette conclusion est basée sur les données physicochimiques et pharmacocinétiques, en supposant que le patient ingère immédiatement la totalité du comprimé écrasé, Par ailleurs, les PA de COMBIVIR existent séparément sous forme buvable : Epivir et Retrovir solution buvable,
Comtan 200mg	Comprimé pelliculé			-	3 oui/6 + labo	Aucune donnée, Ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante, Risque de perte de principe actif au moment du broyage, Le PA est jaune et très colorant, Le cp broyé est à administrer sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable.

Concerta LP 18, 36 et 54 mg	Comprimé à libération prolongée		Forme LP		1 non/1	pas d'info labo mais forme à LP donc impossible
Contalax	Comprimé gastro-résistant		D'après le RCP "les cps doivent être avalés avec un verre d'eau, sans les croquer".	Autre laxatif buvable	2 non/2	
Contramal 50 mg	Gélule		Mélanger dans aliments semi-liquides		5 oui/5+labo	Contenu amer donc diluer dans aliments semi-liquides
Contramal LP 100, 150 et 200 mg	Comprimé à libération prolongée			Contramal 50mg	3 non/3	
Copegus 200mg	Comprimé pelliculé		D'après le RCP les cps ne doivent être ni casser, ni écraser (risque teratogène)	Rebetol 40mg/ml, sol buv, fl. de 100ml	3 non/3	
Cordarone 200mg	Comprimé sécable		Administrer avant, pendant ou en dehors du repas.	-	9 oui/9	
Corgard 80 mg	Comprimé sécable				2 oui/2	
Cortacyl 1mg, 5mg et 20mg	Comprimé (sécable pour le 20mg)		Photosensible - administration extemporanée	solupred orodispersible	7 oui/9+labo	D'un point de vue galénique les cps ne sont pas à libération modifiée, Possible de les écraser si administration est extemporanée car le PA est sensible à la lumière , Aucune donnée sur ce mode administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinetiques, pharmacodynamiques et la tolérance,
Corvasal 2 et 4 mg	Comprimé sécable (2 mg)		administration immédiate car photosensible. Administrer au cours des repas.		8 oui/8	
Cotareg 80 mg	Comprimé pelliculé			Autre Sartan + diurétique : Hytacand comp etc...	3 non/3	
Coumadine et 5 mg	Comprimé sécable		Attention a la dose, marge thérapeutique étroite!!administration immédiate, ne pas consommer avec des aliments riches en vit K (carottes, brocolis,céréales)	-	8 oui/8	
Coveram (Tous dosages)	Comprimé				labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Coversyl 2,5, 5 et 10 mg	Comprimé pelliculé		Administrer en une prise le matin avant le repas avec un verre d'eau.	-	7 oui/7 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Cozaar 50 et 100mg	Comprimé pelliculé (sécable pour le 50mg)		Administrer à jeun ou au cours d'un repas.	Autre Sartans: Aprovel comp, Atacand comp etc...	6 oui/7 + labo	Pas d'étude faite. Le PA a une amertume marquée.
Créon 12000 U et 25000 U	Gélule de microgranules gastro-résistantes		Ne pas écraser le contenu. A administrer au cours ou en fin de repas	-	7 oui/7	
Crestor 5, 10 et 20 mg	Comprimé pelliculé			autres statines :Tahor, Pravastatine	2 oui/6 + labo	Pas d'étude réalisée mais possible car cp a libération immédiate
Crixivan	Gélule		goût amer mélanger avec jus, prise à jeun		3 oui/3	
Cymbalta 60 mg	Gélule gastro-résistante				3 non/3	
Cynomel 0,025 mg	Comprimé sécable		A jeun.		2 oui/2	
Cystagon 50 et 150mg	Gélule		Ne pas diluer le contenu dans un liquide ou un aliment acide	-	1 oui/1 + labo	D'après le RCP : Chez l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans environ, chez qui il existe un risque de fausse-route, les gélules doivent être ouvertes et leur contenu mélangé à la nourriture . Quelques informations préliminaires montrent que la poudre peut être mélangée parfaitement aux aliments tels que le lait, les pommes de terre et d'autres produits à base d'amidon. Il convient cependant d'éviter les boissons acides, telles que le jus d'orange, avec lesquelles la poudre se mélange mal et peut précipiter.

Cytotec 200mg	Comprimé sécable		prise avant les repas		5 oui/5 + labo	Il est possible d'écraser les cps de CYTOTEC pour faciliter leur administration : ingestion en association avec un milieu liquide tel que le lait ou l'eau, à condition que cette préparation soit réellement extemporanée. En effet, la stabilité du misoprostol en milieu liquide est médiocre et la durée de vie relativement courte. Dans de telles conditions, l'ingestion d'aliments devra être stoppée 1 heure avant la prise de CYTOTEC et ne reprendra que 30 min après.
Dafalgan 1g	Comprimé pelliculé		-	Efferalgan 500mg, comprimé effervescent; Dafalgan 600mg, suppositoire	2 non/2 + labo	Avaler tel quel dans l'amm//rien ne s'oppose d'un point de vue galénique mais aucune donnée de bioéquivalence ou de stabilité//toute modalité d'utilisation non validée par amm est sous la responsabilité des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge thérapeutique
Dafalgan 500mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Efferalgan 500mg, comprimé effervescent; Dafalgan 600mg, suppositoire	4 non/4+labo	Avaler tel quel avec une boisson dans l'amm//rien ne s'oppose d'un point de vue galénique mais aucune donnée de bioéquivalence ou de stabilité//toute modalité d'utilisation non validée par amm est sous la responsabilité des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge thérapeutique
Dafalgan codeïne 500mg/30mg	Comprimé pelliculé		PA très amer	Efferalgan codéiné cp effervescent	3 non /6+labo	Pas écrasement ni de sécabilité mentionnés dans l'amm//rien ne s'oppose d'un point de vue galénique mais aucune donnée de bioéquivalence ou de stabilité//toute modalité d'utilisation non validée par amm est sous la responsabilité des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge thérapeutique
Daflon 500mg	Comprimé pelliculé		-	Ginkor fort sachets	5 oui/8 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Dalacine 300mg	Gélule		-	-	4 oui/4+labo	Aucune ref biblio // mode d'administration en ouvrant la gélule est hors amm donc non recommandé par le labo // dalacine iv pas de données validées par amm pour administrer cette spécialité par SNG
Dantrium 25mg et 100mg	Gélule		A administrer au cours ou en fin de repas. mélanger avec aliment, pas eau		7 oui/7	
Daonil 5mg	Comprimé sécable		A administrer au début du repas, Goût amer	-	8 oui/8	
Daonil faible 1,25mg	Comprimé		A administrer au début du repas, Goût amer	-	7 oui/7	
Debridat 100 et 200 mg	Comprimé pelliculé		-	Débridat 4,8mg/ml, susp buv, fl. de 125ml ou sachet 74,4 mg	2 oui/6 + labo	Cps ne sont ni GR ni à libération différée leur galénique ne permet pas d'en interdire le broyage // mais non recommandé par le labo car en plus alternative par forme buvable
Decontractyl 500 mg	Comprimé enrobé			Autre myorelaxant: Thiocolchicoside comprimé	1 non/2 + labo	Aucune étude // cp enrobé pour masquer le goût du PA
Dectancy 0,5mg	Comprimé			Celestene gouttes buvables	2 oui/3 + labo	aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Au niveau galénique le cp étant nu et sécable il peut être écrasé // Le PA est peu soluble dans l'eau .
Delursan 250mg	Comprimé pelliculé		goût très amer mélanger compote, prise pendant le repas		3 oui/3	
Dépakine chrono LP 500mg	Comprimé sécable		Ne pas croquer, ni écraser. A administrer au cours ou en fin de repas	Dépakine 200mg/ml, sol buv, fl. de 40ml; Micropakine LP 500mg, sachet	10 non/10	
Depakine 500	Comprimé gastro-résistant		prise pendant le repas	Forme buvable	3 non/3	
Depakote 250mg et 500mg	Comprimé gastro-résistant		Ne pas croquer	Dépakine 200mg/ml, sol buv, fl. de 40ml	8 non/8	
Depamide 300mg	Comprimé gastro-résistant		Ne pas croquer. A administrer au cours ou en fin de repas	-	11 non/11	
Déprenyl 5mg	Comprimé sécable		Prise le matin	-	5 oui/5	

Déroxat 20 mg	Comprimé pelliculé sécable		Ne pas écraser. Pelliculage qui masque le goût, Ne pas croquer. Administrer le matin au cours du petit déjeuner avec un grand verre d'eau.	Deroxat 2mg/ml, susp buv, fl. de 150ml	4 non/10+ labo	Si nécessaire, le comprimé de DEROXAT peut être écrasé pour être administré par sonde naso-gastrique. La suspension buvable peut être également administrée par sonde naso-gastrique. Cependant la suspension étant légèrement visqueuse, il est préférable de la diluer dans de l'eau immédiatement avant de l'administrer.
Détensiel 10mg	Comprimé enrobé sécable		Goût amer	-	7 oui/7 + labo	Goût amer masqué par le pelliculage // administration extemporanée
Dexambutol 500 mg	Comprimé pelliculé				1 oui/1 + labo	D'après le RCP : pour les nourrissons, les comprimés seront écrasés et mélangés à l'alimentation ou à une boisson.
Diamicron LP 30mg	Comprimé à libération prolongée		Ne pas croquer. A administrer au début du repas	autres sulfamides hypoglycémiant : Daonil, Glutril	9 non/10 +labo	S'agissant d'hypoglycémiant mieux vaut avoir recours à l'insuline, risque de variation trop importante de la glycémie
Diamox 250mg	Comprimé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas avec aliment ou sirop pour masquer l'amertume	-	8 oui/8	
Diastabol 50 et 100 mg	Comprimé		Possibilité de croquer le cp		1 oui/1 + labo	Aucune étude spécifique réalisée avec les comprimés de DIASTABOL écrasés .
Dicetel 100mg	Comprimé pelliculé		oui mais uniquement si administration par SNG	D'après le RCP "les cps doivent être ingérés sans les croquer, ni les sucer".	1 oui/1 + labo	Non recommandé d'écraser les comprimés sauf pour une administration par sonde gastrique (produit abrasif sur la muqueuse oesophagienne). Pas d'étude concernant la modification éventuelle des paramètres pharmacocinétiques quand la forme galénique est modifiée.
Dicodin LP 60mg	Comprimé à libération prolongée				1 non/1	pas d'info labo mais forme à LP donc impossible
Dicynone 250 et 500 mg	Comprimé		-	Dicynone 250mg/2ml inj à diluer dans de l'eau et à administrer par voie orale	1 non/6 + labo	Le RCP ne le préconise pas // alternative par la forme injectable qui peut être administrée par voie orale après dilution dans un demi verre d'eau
Didronel 200 et 400 mg	Comprimé				1 oui/1 + labo	Les comprimés peuvent être écrasés pour les passer dans une sonde de nutrition entérale ou pour faciliter l'ingestion du comprimé (ne pas dissoudre dans du lait). Toutefois, cet usage n'est pas recommandé car pas d'info concernant l'absorption et la tolérance du Didronel lorsqu'il est écrasé.
Diffu-K 600mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu. Eviter la prise simultanée de lait	Potassium Rivhaerd en sirop 3% ou en sachets	8 oui/9 + labo	Masquer les microgranules de potassium car risque d'ulcération de l'estomac (très délicat) // boire avec un grand verre d'eau // ne pas croquer les microcapsules;
Difrel 100mg	Comprimé pelliculé		D'après le RCP "les cps sont à avaler sans les croquer, avec un verre d'eau".	-	4 oui/4	
Digoxine 0,25 mg	Comprimé sécable		Produit à marge thérapeutique étroite. Prise pendant les repas	Digoxine 50µg/ml, sol buv, fl. de 60ml	7 non/10	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par une solution buvable
Di-hydan 100mg	Comprimé sécable		Mélanger les cps écrasés à de la nourriture. A administrer toujours à la même heure. Pendant ou après le repas	-	6 oui/7 + labo	Dans le RCP il est mentionné qu'il est possible d'écraser les cps
Dipiperon 40mg	Comprimé sécable			Existe une solution buvable 40 mg/ml, fl de 30 ml	4 non/5 + labo	Déconseillé car pas d'étude de biodisponibilité des cps écrasés // alternative par la solution buvable 40mg/ml qui a la même indication et posologie que dipiperon 40mg cp
Disulone 100mg	Comprimé sécable		D'après le RCP les cps peuvent être écrasés et mélangés à un liquide ou un yaourt.	-	3 oui/3	
Ditropan 5mg	Comprimé sécable		A prendre à jeun ou au cours des repas avec de l'eau ou du lait.	-	4 oui/4 + labo	Aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // au niveau galénique le cp étant nu et sécable il peut être écrasé l'oxybutine est soluble dans l'eau . A protéger de la lumière
Dogmatil 50 mg	Gélule			DOGMATIL 200ml solution buvable 0,5mg/100ml sans sucre	4 non/5	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par une solution buvable

RCP du
04/08/2011

RCP du
28/09/2011

Dogmatil 200 mg	Comprimé sécable			DOGMATIL 200ml solution buvable 0,5mg/100ml sans sucre	5 non/6 + labo	aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // cp nu // Le PA est pratiquement insoluble dans l'eau // Alternative par une solution buvable à 0,5mg/100ml sans sucre
Doliprane 500 mg	Comprimé		Très amer. A avaler tels quels.	Sachet, cp effervescent, suppo	2 oui/2	
Doliprane 500 mg	Gélule		Très amer. A avaler tels quels.	Sachet, cp effervescent, suppo	3 oui/3	
Dopergine 0,2 mg, 0,5mg	Comprimé sécable		Administration immédiate, PA photosensible		2 oui/2	
Driptane	Comprimé sécable		photosensible - administration extemporanée		5 oui/5	
Duphaston 10mg	Comprimé pelliculé		administration immédiate	-	3 oui/3	
Duspatalin 200mg	Gélule		Ne pas écraser les microgranules.		labo	L'ouverture des gélules est possible mais attention il ne faut pas écraser les microgranules. L'administration des microgranules est recommandée avant les repas.
Ebixa 10mg, 20 mg	Comprimé pelliculé		Goût amer, ne pas mélanger avec du pamplemousse	Ebixa 0,5mg/goutte, sol buv en gouttes, fl. de 50ml	4 oui/9+labo	Aucune donnée // la forme cp pelliculé est une forme à libération immédiate donc pas de modification significative des constantes pharmacocinétiques // rôle du pelliculage sert à masquer l'amertume // il existe une solution buvable en gouttes
Ecazide 50mg/25mg	Comprimé sécable		-	-	3 oui/3	
Effexor 50mg	Comprimé		dissoudre le comprimé écrasé dans de l'eau puis bien rincer la sonde		4 oui/4	
Effexor LP 37,5 et 75 mg	Gélule à libération prolongée		Attention à ne pas écraser le contenu. A administrer au cours du repas	-	4 oui/9 + labo	Pratiqué hors AMM donc non recommandé // la forme LP est assurée par diffusion du PA au travers de la membrane des sphéroïdes (diffusion non ph dépendante) // mélanger les microgranules dans un aliment sucré (compote de pommes par ex) // L'aliment sucré doit être avalé immédiatement sans le macher et suivi par la prise d'un verre d'eau pour s'assurer que les microgranules sont bien avalés // la pharmacocinétique de la forme LP n est pas altérée // aucune étude n'a été faite sur SNG mais il est à prévoir que l'efficacité et la biodisponibilité soient inchangées // le calibre de la sonde doit être supérieur ou égal à 14 ou 16 F car sinon les sphéroïdes risquent de boucher les sondes // rincer ensuite la tubulure 2 ou 3 fois pour que les sphéroïdes n'adhèrent plus aux parois,
Effortil 5mg	Comprimé			Heptamyl sol buvable ou Effortil sol buvable 1cp=10gttes	1 non/1	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par une solution buvable
Elavil 25mg	Comprimé pelliculé			Laroxyl 40mg/ml sol buvable	1 non/1	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par une solution buvable
Elisor 10, 20 et 40mg	Comprimé sécable				5 oui/5	
Emend 80mg et 125mg	Gélule		Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser le contenu	-	2 non/3	D'après Vidal et Theriaque : La gélule doit être avalée entière. Ce médicament peut être pris avec ou sans aliments.
Emtriva 200mg	Gélule			Emtriva 10mg/ml, sol buv, fl. de 170ml	1 non/1 + labo	Les gélules sont normalement réservées aux patients qui peuvent avaler. Emtriva est disponible sous forme de solution buvable à 10mg/ml pour le nourrisson de plus de 4 mois, l'enfant, les patients ne pouvant pas avaler de gélule et pour les patients pour lesquels une adaptation de posologie est nécessaire. La solution buvable peut être directement administrée dans une sonde. La posologie recommandée de la solution buvable d'Emtriva est chez les patients adultes, de 240mg (24ml) une fois par jour.
Endotelon	Comprimé gastro-résistant				2 non/2	

Endoxan 50mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. produit cytotoxique	-	2 non/2	
Entocort 3 mg	Gélule contenant microgranules gastro-résistantes		Ne pas écraser les granules, Avec jus d'orange ou coca		1 oui/2 + labo	Elles peuvent être ouvertes mais ne doivent pas être ni croquées, ni machées
Epitomax 100mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	Epitomax 15mg, 25mg et 50mg, gélules	4 non/4+labo	Existe des gélules qui peuvent être ouvertes
Epitomax 15mg, 25mg, 50mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu	-	4 oui/4+labo	Peut être ouverte et mélangée dans nourriture. Mélange alimentation médicament doit être immédiatement avalé sans être maché. Ne pas conserver le mélange pour utilisation ultérieure
Epivir 150mg et 300mg	Comprimé pelliculé		prise de préférence à jeun	Epivir 10mg/ml, sol buv, fl. de 240ml	5 non/5	
Equanil 250mg, 400mg	Comprimé enrobé sécable		Ne pas croquer PA stable mais amer et peu soluble dans l'eau	Equanil 400mg/5ml, sol inj. (IM profonde)	5 oui/10+labo	Aucune donnée sur cp pilés pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // le meprobamate est un PA très stable et peu soluble dans l'eau. Cependant le broyage peut faire ressortir l'amertume du PA par disparition du vernis
Ercefuryl 200 mg	Gélule		La poudre est insoluble dans l'eau, la mélanger dans un aliment semi liquide: yaourt, purée ou compote		1 oui/3 + labo	Aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // D'un point de vue galénique, il est possible d'ouvrir les gel mais le produit est insoluble dans l'eau. Il est préférable de mélanger extemporanément le PA à un aliment semi solide (yaourt, compote, purée...) // attention: nouvelle présentation d Ercefuryl, boîte de 12 gel exclusivement réservé à l'adulte (à partir de 15 ans)
Erythrocline 500 mg	Comprimé pelliculé			Granulés pour solution buvable à 100mg // granulés pour solution buvable à 500mg // granulés pour sirop à 500mg/5ml // granulés pour sirop à 250mg/5ml	2 oui/2	
Esidrex 25mg	Comprimé sécable		gout désagréable, administration extemporanée	-	8 oui/8+ labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de pa au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable.
Esperal 500mg	Comprimé		Avaler le matin avec un demi verre d'eau.		1 oui/1 + labo	Aucune étude spécifique réalisée avec les cps d'ESPERAL écrasés. Il existe sur le comprimé, une "croix" dite croix de "fantaisie" pouvant permettre au patient de couper le comprimé avant de le prendre.
Eskazole 400mg	Comprimé		-	-	2 oui/2	
Estracyt 140mg	Gélule		Produit cytotoxique		1 non/1 + labo	D'après le RCP les gélules doivent être avalées entières avec un peu d'eau. En aucun cas, elles ne doivent être ouvertes, sucées mâchées ni même mordues. L'estramustine est irritant et ne doit pas rentrer en contact avec la muqueuse oesophagienne.
Eulexine 250 mg	Comprimé sécable				3 oui/3	
Eupantol 40 mg	Comprimé gastro-résistant			Autre IPP: Inexium 40 mg comp dispersible, Mopral, Lanzor	2 non/2	
Euphylline 50mg, 100mg, 200mg, 300mg et 400mg	Gélule LP		Ne pas écraser le contenu	Dilatrane 10mg/ml, sirop, fl; de 200ml	7 oui/7	
Eupressyl 30 et 60mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu. sans trop remuer, administration immédiate car libération du PA dans l'eau	-	7 oui/9 + labo	Forme galénique retard // pas de données galénique permettant de recommander l'ouverture des gélules
Eurelix LP 6mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu	-	5 oui/5	
Eurobiol 25 000u	Gélule contenant des microgranules gastro-résistants		D'après le RCP : ouverture possible, mais ne pas croquer les microgranules. Les administrer dans un milieu non alcalin (jus d'orange par exemple)	Eurobiol 12 500U/dose, fl. de 20g	2/3 + labo	ouverture possible mais dissoudre dans quelque chose d'épais, de consistant (pas dans du liquide)

Euthyral 20µg/100µg	Comprimé sécable				1 non/1 + labo	il est possible d'écraser les comprimés mais n'ayant pas de données de stabilité après broyage, ceci est à faire de manière extemporanée.
Exacor 130 mg	Comprimé pelliculé sécable		-	-	2/2+labo	Le pelliculage n'est pas un film gastro-résistant mais il permet une meilleure identification et une meilleure opération de conditionnement.
Exacyl 500 mg	Comprimé pelliculé		utilisation de la forme buvable	proposer exacyl inj ampoule	2 non/2	
Exelon 1,5mg, 3mg, 4,5mg et 6 mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu. A administrer au cours ou en fin de repas.	Exelon 4,6mg/24h, 9,5mg/24h, dispositif transdermique. Existe forme buvable	8 non/8	
Extranase 900nk	Comprimé gastro-résistant		Ne pas croquer	-	3 non/3	
Ezetrol 10mg	Comprimé enrobé		-	-	2 oui/3 + labo	Aucune donnée sur biodisponibilité stabilité et efficacité sur administration après écrasement donc non recommandé
Fansidar 500mg/25mg	Comprimé quadrisécable		Administration extemporanée		1 oui/1 + labo	Il est précisé dans le RCP que "chez les enfants de moins de 6 ans, en raison des risques de fausse route liés à la forme pharmaceutique, les comprimés devront être préalablement écrasés avant d'être donnés". Les comprimés écrasés devront être utilisés extemporanément et ne pourront donc pas être conservés pour une utilisation ultérieure,
Farlutal 500mg	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	Aucune étude n'a été menée pour évaluer la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance après ouverture des gélules et mélange du contenu dans de l'eau ou dans d'autres diluants (compote de pomme, autres aliments). Pas de recommandations de la part du labo.
Feldene 10 et 20mg	Gélule			Feldene 20mg comprimé dispersible		D'après le RCP les gélules sont à avaler telles quelles avec un grand verre d'eau au cours d'un repas.
Femara 2,5 mg	Comprimé pelliculé		administration extemporanée		1 oui/3 +labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable.
Flagyl 250mg, 500mg	Comprimé pelliculé		-	Flagyl 125mg/5ml, susp buv, fl. de 120ml	6 oui/7+labo	Il n'y a pas lieu d'écraser car existe une alternative flagyl en suspension buvable // aucune donnée sur cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques
Flecaïne 100mg	Comprimé sécable		-	-	8 oui/9 + labo	Aucune donnée de pharmacocinétique donc déconseillé
Flécaïne LP 50mg, 100mg, 150mg et 200mg	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu	-	6 oui/6 + labo	Gel peuvent être ouvertes pour avaler sans croquer les microgranules car elles sont LP
Flodil LP 5mg	Comprimé enrobé à libération prolongée		-	autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium	5 non/5	
Floxyfral 50 et 100 mg	Comprimé pelliculé		D'après le RCP : "les cps doivent être avalés avec de l'eau sans être croqués".		5 oui/5	
Fludex 2,5mg	Comprimé pelliculé				1 oui/1 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Fludex LP 1,5mg	Comprimé pelliculé à libération prolongée		Ne pas croquer. Administrer le matin avec de l'eau.	autres diurétique hypokaliemiants : Lasilix buv, Esidrex, Tenstaten	10 non/10	
Fludrocortisone 10µg et 50µg	Comprimé sécable		administration extemporanée	-	7 oui/7	
Fluvermal 100mg	Comprimé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas	FLUVERMAL solution buvable	3 oui/5 + labo	oui mais Alternative par une forme buvable

Folinoral 5 et 25 mg	Gélule				labo	Il s'agit d'une forme à libération immédiate (aucun artifice galénique particulier) donc il n'y a pas de problème pour ouvrir la gélule. Il n'est pas impossible d'utiliser le contenu des gélules pour une administration par sonde gastrique. Néanmoins la poudre pourrait adhérer à la tubulure, il faut donc la diluer préalablement dans un support neutre (eau pour préparation injectable par exemple)
Fonzylane 150 mg	Comprimé pelliculé				3 oui/3	
Fortzaar 100mg/12,5mg et 100mg/25mg	Comprimé pelliculé		Mise en suspension extemporanée		1 oui/3 + labo	Aucune étude. Le PA est soluble dans l'eau et est non photosensible.
Fosamax 10 et 70mg	Comprimé		Ne pas laisser fondre dans la bouche. Ne pas sucer. Ne pas croquer. A jeun le matin au moins 1/2 heure avant l'absorption des premiers aliments avec un grand verre d'eau. Avaler en position assise ou debout, ne pas s'allonger pendant au moins 30 minutes après la prise du comprimé.	protelos 2g granulés pour susp buv en sachet	7 non/7	
Fosavance 70mg/2800 UI et 70mg/5600 UI	Comprimé		PA irritant pour les muqueuses buccale et oesophagienne		4 non/4	
Fozitec / fosinopril / foziretic 10mg et 20mg	Comprimé sécable		Administrer en dehors ou au cours d'un repas.	-	7 oui/7 + labo	Possible de broyer les cps // n'ayant pas de donnée de stabilité après broyage ceci est à faire de façon extemporanée.
Fucidine 250mg	Comprimé pelliculé		PA amer, administration immédiate	Fucidine 50mg/ml, susp buv, fl. de 50ml	4 oui/7 + labo	Pelliculage car goût amer; le mélanger avec un liquide sucré et administrer immédiatement. Ne pas mélanger à du lait. Alternative en suspension buvable.
Fumafer 66mg	Comprimé pelliculé		Pour limiter les effets indésirables, fractionner la dose en plusieurs prises.	Fumafer poudre orale 33mg/1g	6 oui/10 + labo	aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinetiques et pharmacodynamiques // alternative par la poudre orale
Fungizone 250mg	Gélule		A jeun	Fungizone 10%, susp buv, fl. de 40ml	3 oui/5 + labo	Pas d'ouverture mentionnée dans l'AMM// rien ne s'oppose d'un point de vue galénique mais aucune donnée de bioéquivalence ou de stabilité
Furadantine 50mg	Gélule		A administrer pendant le repas - Administration extemporanée	-	6 oui/6	
Gabacet 400mg	Gélule			Gabacet 1,2g, amp buv; Nootropyl 20%, sol buv, fl. de 125ml	2 non/2	
Gardenal 10, 50 et 100mg	Comprimé		A administrer toujours à la même heure	-	11 oui/11	En raison du risque de fausse route chez les enfants, le cp sera écrasé et mélangé aux aliments.
Glibenese 5mg	Comprimé sécable		prise juste avant le repas	-	4 oui/4	
Glimépiride 1, 2, 3 et 4mg	Comprimé		-	autres sulfamides hypoglycémiantes : Daonil, Glutril	1 non/2+labo	Aucune donnée ne permettant d'écraser les cps
Glivec 100mg	Comprimé enrobé sécable		Produit cytotoxique	-	2 non/2	
Glucidoral 500 mg	Comprimé sécable				1 non/3 + labo	S'agissant d'hypoglycémiant mieux vaut avoir recours à l'insuline. Risque d'hypoglycémie
Glucophage 500mg, 850mg et 1000mg	Comprimé pelliculé (sécable pour le 1000mg)		Administration extemporanée, A administrer en cours ou en fin de repas	Glucophage poudre pour solution buvable à 500, à 850 et à 1000mg	7 non/9+labo	Goût très amer de la metformine masqué par le pelliculage. N'ayant pas de donnée de stabilité après broyage ceci est à faire de façon extemporanée. // cette spécialité est disponible sous forme de poudre pour suspension buvable en sachet-dose
Glucor 50 et 100mg	Comprimé (sécable pour le 100mg)		Administrer au début d'un repas avec de l'eau ou en croquant le comprimé.	-	8 oui/8	
Glutril 25mg	Comprimé-sécable		-	Arrêt commercialisation	4 oui/4	

Gutron 2,5mg	Comprimé		Principe actif photosensible à Administration immédiate, mélange aqueux seulement, prise avant le repas, ne pas associer à une alimentation riche en lipides		5 oui/7 + labo	non recommandé par le labo car absence de données pharmacocinetiques // pas d'AMM pour ce mode d'administration
Gynergéne caféiné 1mg/100mg	Comprimé				1 non/2 + labo	Aucune étude clinique n'a été menée sur l'utilisation de ces médicaments une fois les comprimés écrasés et aucune donnée à ce sujet dans l'AMM, Donc pas de garantie sur la qualité et l'efficacité de cette spécialité lors d'une telle utilisation
Haldol 1 et 5mg	Comprimé		Ne pas croquer. Ne pas macher. Avaler avec de l'eau.	Haldol 2mg/ml, sol buv en gouttes, fl. de 15ml	9 non/9	
Halfan 250 mg	Comprimé sécable			Halfan sol buvable 1c mesure=100mg	2 non/2	
Havlane 1mg	Comprimé sécable		Administrer le soir avant le coucher.	-	4 oui/4	
Hemi daonil 2,5mg	Comprimé sécable				3 oui/6 + labo	aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinetiques et pharmacodynamiques // forme a libération immédiate
Hemigoxine native 0,125mg	Comprimé		Marge thérapeutique étroite, préférer la forme buvable	DIGOXINE 60ml 5µg/0,1ml solution buvable	5 non/8	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par une forme buvable
Hepsera 10mg	Comprimé		Goût désagréable	-	1 oui/1 + labo	Les données de pré-formulation du produit permettent d'envisager la dissolution du comprimé d'Hepsera dans 100 ml d'eau pour administration immédiate (aucune étude n'a été faite pour garantir la stabilité de la solution) par sonde gastrique uniquement en raison du goût du produit obtenu.
Heptamyl 187,8mg	Comprimé			Heptamyl 30,5%, sol buv, fl. de 20ml (1 cp = 15 gouttes)	8 non/10 + labo	aucune donnée sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinetiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps dans la mesure où il existe une alternative par une solution buvable 30,5%
Hexaquine 120mg/32mg	Comprimé pelliculé		-	-	5 oui/5	
Hexastat	Gélule		produit cytotoxique		2 non/2	
Humatin 250mg	Gélule			HUMATIN 125mg/5ml solution buvable	1 oui/1 + labo	Pas de données sur la possibilité d'ouvrir les gélules
Hydergine	Comprimé sécable			HYDERGINE 1mg/ml solution buvable en gouttes, prise avant le repas	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par une solution buvable en gouttes
Hydrea 500mg	Gélule		Produit cytotoxique. Ne pas faire manipuler par femme enceinte se protéger avec gants et masque; adm. aussitôt après la mise en suspension	-	5 oui/7 + labo	Dans l'AMM// la gélule peut être dispersée dans un verre d'eau et ingérée immédiatement. Il est normal que certains excipients non solubles persistent en surface.
Hydrocortisone 10mg	Comprimé sécable		mélanger avec un aliment	-	9oui/9	
Hyperium 1mg	Comprimé		administration immédiate, prise juste avant le repas	-	9oui/9 + labo	Peut être administrés en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Hypostamine 100 mg	Comprimé				2oui/2	
Hytacand 8 et 16 mg	Comprimé		Administrer au cours ou en dehors d'un repas.		6oui/6	
Hyzaar 50mg/12,5mg	Comprimé pelliculé		Mise en suspension extemporanée, Administrer au cours ou en dehors d'un repas.		2 oui/4 + labo	Aucune étude. Le PA est soluble dans l'eau et est non photosensible.
Ibuprofène 200, 400mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Ne pas sucer. Administrer au cours d'un repas. Goût amer	Advil 20mg/ml, susp buv, fl. de 200ml, Sur avis du prescripteur et adaptation de la posologie, Autre AINS: Apranax sachet, Feldene 20mg etc...	3 non/5 + labo	Pas de recommandations ni d'études faites, le broyage est considéré comme une utilisation hors AMM.

Icaz LP 2,5 mg, 5mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium	5non/5	
Idarac 200mg	Comprimé sécable		Possibilité de delayer dans de l'eau		2oui/2	
Ikorel	Comprimé sécable		Ne pas ouvrir la plaquette au niveau de la bande de couleur.		3oui/3	
Imigrane 50mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer, Proposer imigrane 20 mg pulverisateur	Imigrane 20mg, solution nasale, amp 0,1ml	3 non/4 + labo	Pas d'étude. Les comprimés doivent être avalés sans être croqués avec un grand verre d'eau. L'écrasement pourrait entraîner des nausées et vomissements dus à un goût désagréable ou amer.
Imodium 2mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Imodium 20mg/100ml, sol buv, fl. de 90ml	2 oui/7+labo	Gel non gastrorésistantes donc possibilité de les ouvrir
Imovane 3,75 et 7,5mg	Comprimé enrobé sécable		Administrer le soir avant le coucher.PA photosensible, goût amer	-	9 oui/9+labo	Aucune donnée sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // d un point de vue galénique les cps sont pelliculés
Imurel 25mg et 50mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Produit cytotoxique	-	5non/5	
Indocid 25mg	Gélule		A administrer au cours ou en fin de repas	Indocid 50mg et 100mg, suppositoires	6non/6	
Inexium 20mg et 40mg	Comprimé gastro-résistant		Ne pas croquer. Possible de diluer le cp dans de l'eau ou de l'administrer par une SNG	préférer l'inexium granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet-dose. Ogastoro 15mg et 30mg, comprimés orodispersibles	10non/10	RCP : Chez les patients ayant des difficultés pour avaler, les comprimés peuvent aussi être dispersés dans un demi verre d'eau non gazeuse. Aucun autre liquide ne doit être utilisé car l'enrobage entérique peut être dissous. Remuer jusqu'à délitement des comprimés et boire la solution avec les granules immédiatement ou dans les 30 minutes. Rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les granules ne doivent pas être mâchés ni croqués. Pour les patients ne pouvant pas avaler, les comprimés peuvent être dispersés dans de l'eau non gazeuse et administrés par sonde gastrique.
Inipomp 20mg, 40 mg	Comprimé gastro-résistant			préférer l'inexium granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet-dose	2non/2	
Inspra 25 et 50mg	Comprimé pelliculé				1 non/1 + labo	En l'absence de données pharmacocinétiques comparant la bioéquivalence entre différents modes d'administration et en l'absence de données d'efficacité, de stabilité et de sécurité des cps coupés, broyés ou écrasés, le labo ne recommande ni ne suggère la coupure des comprimés en deux, leur broyage ou leur écrasement pour une reconstitution en gélules ou une administration par SNG.
Invirase 500mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. A administrer au cours ou dans les 2 heures après le repas,	-	1 non/1 + labo	D'après le RCP : Les comprimés d'Invirase doivent être avalés entier; Invirase doit être pris en même temps que le ritonavir pendant ou après les repas.
Invirase 200mg	Gélule				2 oui/2 + labo	D'après le RCP : Les gélules d'Invirase doivent être avalées telles quelles; Invirase doit être pris en même temps que le ritonavir pendant ou après les repas.
Iperten 10 mg, 20 mg	Comprimé		D'après le RCP "les cps doivent être avalés, le matin, après le petit-déjeuner, sans les croquer avec un peu de liquide".		1 non/1 + labo	La galénique ne s'oppose pas à l'écrasement toutefois le labo ne le recommande pas car aucune étude n'a été faite.
Isoprinosine 500 mg	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	D'un point de vue galénique le cp étant nu et sécable, il peut être écrasé en cas de nécessité, mais aucune étude spécifique n'a été réalisée avec les cps d'ISOPRINOSINE écrasés.
Isoptine 40mg	Comprimé pelliculé		A administrer au cours ou en fin de repas	-	11oui/11	
Isoptine 120mg	Gélule		A administrer au cours ou en fin de repas	-	9oui/9	
Isoptine LP 240mg	Comprimé pelliculé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas	Isoptine 40 mg ou 120 mg	9non/9	
Isorhythm LP 125mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu		2oui/2	
Ixel 25mg et 50mg	Gélule		A administrer au cours ou en fin de repas	-	8oui/8	

Ixprim 37,5mg/325mg	Comprimé pelliculé		Utilisation extemporanée, Goût amer. D'après RCP : les cps doivent être avalés tels quels, avec un liquide, sans être ni fractionnés, ni mâchés.	Ixprim 37,5mg/325mg comprimé effervescent	4 oui/6 + labo	Aucune étude n'a été réalisée. Il est possible d'écraser le cp si trouble de la dégutition, la poudre obtenue étant amer, il est conseillé de la mélanger à un aliment semi-liquide (yaourt par ex), La forme effervescente est à privilégier chez ce type de patient, Chez les patient sous SNG il est conseillé de dissoudre le cp écrasé dans une solution aqueuse sachant que le tramadol est hydrosoluble et que le paracetamol ne l'est que partiellement, La forme effervescente pourra être plus intéressante même si aucune donnée, Risque de diminution de l'absorption si sonde duodeno-jejunale car les 2 PA sont absorbés au niveau de la partie haute du jéjunum
Izilox 400mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	autres quinolones 2 ^{ème} G : Ofloct, Ciprofloxacine susp buv	4non/4	
Januvia 100mg	Comprimé pelliculé		-	-	2 non/2 + labo	Aucune donnée sur biodisponibilité stabilité et efficacité sur administration après écrasement donc non recommandé
Josir LP 0,4 mg	Gélule contenant des microgranules à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu (microgranules LP)		3 oui/4 + labo	Pas de donnée sur la cinétique et l'efficacité clinique sur l'ouverture des gélules, Les microgranules LP ne doivent pas être écrasées
Kaleorid LP 600mg et 1000mg	Comprimé enrobé à libération prolongée		Ne pas croquer, ni mâcher, ni sucer.	Diffu K 600mg, comprimé	4non/4	
Kaletra 200mg/50mg	Comprimé pelliculé		A administrer au cours ou en fin de repas	Kaletra 80-20mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	6 non/6	
Keal 1g	Comprimé sécable		-	Keal 1g, sachet	1 non/1 +labo	Aucune donnée ne permettant d'écraser les cps
Keforal 500 mg et 1 g	Comprimé pelliculé		A prendre en dehors des repas (interaction avec le lait)	Keforal poudre pour susp buvable	1 non/1	pas d'info labo mais possibilité d'alternative par Keforal poudre pour suspension buvable
Kepra 250mg, 500mg	Comprimé enrobé sécable		Goût amer	Kepra 100mg/ml, sol buv, fl. de 300ml	7oui/7	
Kerlone 20mg	Comprimé pelliculé sécable		Ne pas croquer	autres bêta-bloquants sans ASI: Tenormine, Detensiel, Seloken	3 non/7 + labo	aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, Le PA est soluble dans l'eau
Ketek 400mg	Comprimé pelliculé		Ecraser le comprimé, PA très amer, Gout désagréable: dans une cuillère de compote	Autres macrolides : Erythroline sol buv, Josacine sol buv, Zeclar sol buv, Zithromax sol buv	2 oui/3 + labo	cp pelliculé par un film fin pour masquer l'amertume, Une étude pharmacocinétique conduite chez le sujet sain a conclu à la bioéquivalence entre les cps entiers et cps écrasés, Attention aux possibles reflux très amer si administration par sonde gastrique, Administration possible également chez les patients porteurs de sonde gastrique ou gastrectomisés mais pas de donnée de cinétique
Kivexa 600/300mg	Comprimé sécable		Ne pas croquer.	Ziagen 20mg/ml, sol buv, fl. de 240ml + Eпивir 10mg/ml, sol buv, fl. de 200ml	2non/2	
Kredex 6,25mg, 12,5mg et 25mg	Comprimé sécable		Prise pendant le repas	-	5 oui/6 + labo	D'après le RCP : les cps doivent être avalés avec un volume de liquide suffisant au moment des repas, pour ralentir la vitesse d'absorption et donc réduire la fréquence de survenue d'hypotension artérielle, en particulier orthostatique, ou de décompensation.
Kytril 1mg et 2mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	autre sétron : Zophren	1 non/1 + labo	Aucune étude
Lacteol 170mg	Gélule		-	Lacteol 340mg, poudre pour susp buv	1 oui/2 + labo	oui mais pas d'études réalisées
Lamalaine	Gélule			utilisation de la forme suppositoire	1 non/2 + labo	impossible car présence de poudre d'opium, Alternative par la forme suppositoire
Lamictal 5,25,50 et 100mg	Comprimé dispersible ou à croquer		A administrer toujours à la même heure, pendant le repas	-	9oui/9	

Lamisil 250mg	Comprimé sécable		administration extemporanée, photosensible		2 oui/2+labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable // PA photosensible
Lamprene 50mg et 100mg	Capsule molle		Contenu liquide huileux	-	2non/2	
Lanvis 40mg	Comprimé sécable		Ne pas croquer. Produit cytotoxique	-	2non/2	
Largactil 25 et 100mg	Comprimé pelliculé sécable		PA photosensible	Largactil 4%, sol buv en gouttes, fl. de 30ml	7 non/9 + labo	aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps pelliculés car il existe une alternative par une solution buvable à 4% // le pelliculage contient de l'oxyde de titane qui a un rôle opacifiant pour protéger le PA qui est photosensible
Lariam 250mg	Comprimé sécable		Administration extemporanée des comprimés écrasés	-	3 oui/4 + labo	Il est précisé dans le RCP que "chez les enfants de moins de 6 ans ainsi que chez les personnes ayant des troubles de la déglutition, les comprimés peuvent être écrasés et dissous dans de l'eau". Les comprimés de Lariam ainsi écrasés devront être utilisés extemporanément et ne pourront pas être conservés pour une utilisation ultérieure.
Laroxyl 25mg et 50mg	Comprimé pelliculé		-	Laroxyl 40mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	4 oui/9 + labo	Aucune étude car alternative par une solution buvable
Lasilix 20mg et 40mg	Comprimé (sécable pour le 40mg)		administration immédiate car photosensible	Lasilix 10mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	10oui/10	
Lasilix retard 60mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Lasilix 10mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	9oui/9	
Lasilix spécial 500mg	Comprimé sécable		administration immédiate car photosensible		5oui/5	
Lederfoline 5mg, 15mg, 25mg	Comprimé sécable		à diluer dans l'eau	-	4oui/4	
Leponex	Comprimé sécable				2 oui/2 + labo	Aucune donnée pharmacocinétique entre cp entier et cp écrasé dans alimentation. Présence d'excipients insolubles et mauvais goût de la spécialité, il est conseillé d'administrer les cps écrasés dans l'alimentation. Du fait de la potentialisation de l'effet sédatif, il est recommandé de ne pas utiliser d'alcool pour aider à la solubilisation
Lepticur 10mg	Comprimé		-	-	10oui/10	
Lercan 10 et 20mg	comprimé pelliculé (sécable pour le 10mg)		Ne doivent pas être pris avec du jus de pamplemousse.		3 non/4 + labo	Pas de données
Lescol 20mg et 40mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Autres statines : Tavor, Pravastatine	1 non/1 + labo	Le labo préconise d'avaler les gélules intactes, avec un peu d'eau.
Lescol LP 80mg	Comprimé à libération prolongée		Ne pas croquer	Autres statines : Tavor, Pravastatine	1non/1	Pas d'info labo mais impossible car forme à LP
Lévothyrox 50µg, 100µg et 150µg	Comprimé sécable		A administrer le matin à jeun	L-Thyroxine 150µg/ml, sol buv, fl. de 15ml	5 oui/9+labo	Possible de broyer les cps // n'ayant pas de donnée de stabilité après broyage ceci est à faire de façon extemporanée.
Lexomil 6mg	Comprimé quadrisécable				7 oui/7 + labo	Pas d'info mais coupé en 4, le cp est assez petit
Lioresal 10mg	Comprimé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas, photosensible	-	4 oui/4+labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable // PA photosensible
Lipanthyl 145mg et 160mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer A administrer au cours ou en fin de repas	Lipanthyl 67mg, gélule micronisée	4non/4	
Lipanthyl micronisé 67mg, 200 mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu A administrer au cours ou en fin de repas	-	6oui/6	
Lodoz 2,5mg et 5mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	autres bêta-bloquants sans ASI : Tenormine, Detensiel, Seloken	3 non/4+labo	Non conseillé en raison du pelliculage
Logimax LP 5mg/47,5mg	Comprimé à libération prolongée		Forme retard		1non/1	pas d'info labo mais impossible car forme à LP
Lopressor 100mg	Comprimé pelliculé sécable				1 oui/1	Aucune donnée // le pelliculage n'est pas en faveur de l'écrasement // le labo ne le recommande pas.

Lopressor LP 200mg	Comprimé pelliculé sécable à libération prolongée				1/1 + labo	impossible car forme à libération prolongée
Lopril 25 mg, 50mg	Comprimé sécable		Prise avant le repas		6oui/6	
Loxapac 25, 50 et 100 mg	Comprimé pelliculé			LOXAPAC 25mg/ml en solution buvable	4 non/5 + labo	Cps pelliculés donc leur écrasement et dissolution sont susceptibles de modifier considérablement leur action pharmacocinétique et thérapeutique// alternative par une solution buvable
Loxen 20mg	Comprimé sécable		A administrer 30min avant le repas. PA photosensible	-	4 oui/9 + labo	Possible d'un point de vue galénique, mais aucune donnée quand à la modification éventuelle de la bidispo
Loxen LP 50mg	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu	-	4 oui/9 + labo	Aucune donnée sur modification absorption et biodisponibilité // gélule classique avec mélange de microgranules à libération lente et rapide
Ludiomil 25mg et 75mg	Comprimé pelliculé		Risque de modification de la biodisponibilité	-	4oui/4	
Lutenyl 3,75 et 5 mg	Comprimé (sécable pour le 5 mg)				3oui/3	
Lyrica 25mg, 50mg, 100mg et 300mg	Gélule		-	-	5 oui/7+labo	Absence de données suffisantes et ce malgré une étude interne: au total bioéquivalence entre gélule intacte et dissolution dans 100 ml d'eau et la prise concomitante d'aliment n'a pas affecté la quantité totale absorbée. Malgré cela l'ouverture des gélules est une modalité d'administration hors AMM
Lysanxia 10mg et 40mg	Comprimé (sécable pour le 40 mg)		Comprimé qui se délite en bouche	Lysanxia 15mg/ml, sol buv en gouttes, fl. de 20ml	4 oui/8 + labo	Pas d'étude sur l'écrasement des cps car alternative par la forme buvable
Lysodren 500mg	Comprimé sécable		Ne pas croquer, Produit cytotoxique Porter des gants pour manipuler les comprimés	utilisation de la forme suppositoire	1non/1	pas d'info labo mais impossible car produit cytotoxique
Lysopaine	Comprimé à sucer		-	-	2 non/2	
Lytos	Comprimé pelliculé		Prise à distance des repas (interaction avec le lait)		2non/2	
Mag 2 100mg	Comprimé			Poudre pour solution buvable en sachets	1 non/2	pas d'info labo mais alternative possible par une poudre pour solution buvable
Magné B6 48mg/5mg	Comprimé enrobé		Ne pas croquer. A administrer au cours ou en fin de repas	-	1 non/1 + labo	Aucune étude spécifique réalisée avec les comprimés de MAGNE B6 écrasés
Malocide 50mg	Comprimé		-	-	4oui/4	
Mantadix 100 mg	Capsule molle				3non/3	
Mebeverine 200 mg	Gélule		A prendre avant les repas, avec de l'eau.	<u>Préférer</u> : Spasfon lyoc, Débridat sol buv	2 oui/2 +labo	Aucune donnée ne permettant d'ouvrir les gélules
Mecir LP 0,4 mg	Comprimé pelliculé à libération prolongée				labo	non
Medrol 100mg	Comprimé		dissoudre dans eau	-	3/3+labo	Procédé de fabrication permet de le rendre hydrophile : cp facilement dispersible dans l'eau
Medrol 4, 16 et 32mg	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	Aucune étude n'a été menée pour évaluer la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance des cps écrasés ou pilés puis mélangés dans de l'eau ou dans d'autres diluants (compote de pomme, autres aliments). Pas de recommandations de la part du labo.
Megace 160mg	Comprimé		PA cytotoxique		1non/1	
Meladinine 10mg	Comprimé		PA insoluble dans l'eau		1 oui/1 + labo	Pas de problème pour l'écrasement des comprimés mais le PA est insoluble dans l'eau,
Mepronizine	Comprimé enrobé sécable			Autre hypnotique: Imovane comp, Théralène gtttes buvable etc...	1 non/6+labo	Aucune donnée sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques
Mestinon 60 mg	Comprimé enrobé				6oui/6	

Mestion retard 180mg	Comprimé à libération prolongée				1non/1	pas d'info labo mais forme retard donc impossible
Meteospasmyl 300mg/60mg	Capsule molle				1non/1 + labo	Pas d'info mais impossible car médicament contenant de l'alvérine (produit anesthésiant donc possibilité de fausse route)
Methergin	Comprimé pelliculé			METHERGIN 0,25mg/ml Solution buvable : Flacon de 10 ml, avec mesurette graduée.	labo	Bien que l'écrasement soit possible sur le plan galénique, le labo ne dispose d'aucune donnée quant à la modification éventuelle de la biodisponibilité. Ce mode d'utilisation, qui ne correspond pas à celui que le labo préconise, reste sous votre entière responsabilité.
Méthotrexate 2,5mg	Comprimé		Produit cytotoxique	-	7non/7	
Metopirone 250mg	Capsule molle		Contenu liquide huileux		1/1 + labo	Il est impossible d'ouvrir les capsules de cette spécialité car la forme galénique ne s'y prête pas.
Mianserine 10mg, 30mg et 60mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Anesthésique au contact des muqueuses, utiliser rapidement	-	4 oui/5+labo	Possible de réduire en poudre le cp ; anesthésique au contact des muqueuses ; administration immédiate est recommandée
Micropakine LP 100, 250, 500, 750 et 1000mg	Granulés à libération prolongée (sachets)		ne pas écraser les granulés, Possibilité de mélanger à un aliment mou ou à un liquide (mais pas à des aliments ni à des liquides chauds))		1non/1	pas d'info labo mais impossible car granulés à libération prolongée
Mifegyne 200mg	Comprimé		Administration immédiate	-	2oui/2	
Mimpara 30mg, 60mg, 90mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	-	2non/2	
Minipress 1mg et 5mg	Comprimé sécable		-	-	1 oui/1 + labo	pas d'étude réalisée donc pas d'info
Minirin 0,1mg et 0,2mg	Comprimé		-	Minirin 0.1 mg/mL, sol endonasale, fl. de 2.5 mL // Minirin spray 10 ug/0.1 mL, sol endonasale, fl. de 2.5 mL // Minirinmelt lyophilisats	3 non/4 + labo	non
Minisintrom 1mg	Comprimé		Avaler avec un verre d'eau.	-	6 oui/7 + labo	Possible d'un point de vue galénique, mais aucune donnée quand à la modification éventuelle de la bidispo
Miorel 4mg	Gélule				1 oui/1 + labo	D'après le RCP il faut avaler les gélules avec un verre d'eau. Il faut noter que le PA (thiocolchicoside) est soluble dans l'eau à 99,2%, la poudre contenue dans la gélule est soluble dans l'eau à 97% et il n'y a pas d'interaction avec les aliments connue pour le miorel. De ce fait, l'ouverture de la gélule pour administrer son contenu avec des solutés de nutrition semble être possible.
Mobic 7,5mg et 15mg	Comprimé (sécable pour le 15mg)		-	-	1 oui/1 + labo	Pas de données concernant la cinétique et l'efficacité clinique// forme facilitant leur fractionnement et se délitent facilement dans la bouche
Moclamine 150 mg	Comprimé pelliculé sécable		A prendre en fin de repas.		2oui/2	
Modiodal 100 mg	Comprimé		D'après le RCP "les cps doivent être avalés en entier".		2oui/2	Aucune étude spécifique concernant l'écrasement des comprimés n'a été réalisée. Le labo ne peut donc recommander cette pratique. De plus, PA amer et peu soluble dans l'eau. (labo appelé le 03/11/11)
Moditen 25, 100mg	Comprimé (enrobé pour le 25mg) (sécable pour le 100mg)		PA photosensible et PA sensible à l'humidité.		1 oui/1 + labo	Aucune étude spécifique réalisée avec les cps de MODITEN écrasés.
Modopar 125mg	Comprimé dispersible		Dissoudre dans de l'eau. Agiter avant emploi. Administrer en dehors d'un repas, dans la 1/2 heure qui suit sa préparation (noircissement possible par oxydation).	-	8oui/8	
Modopar 62,5mg, 125mg et 250mg	Gélule		D'après le RCP "le patient doit impérativement avaler la gélule entière, sans la croquer ou l'ouvrir."	Modopar 125mg, comprimé dispersible	9 non/11 + labo	Aucune étude car alternative par une forme dispersible
Modopar LP 125mg	Gélule à libération prolongée			Modopar 125mg, comprimé dispersible	7 non/8 + labo	Aucune étude car alternative par une forme dispersible
Moduretic 5mg/50mg	Comprimé sécable		gout désagréable, prise à distance des repas	-	5oui/5	

RCP du 18/04/2011

RCP du 30/03/2010

Mogadon 5mg	Comprimé sécable		-	-	2oui/2	
Molsidomine 2mg et 4mg	Comprimé sécable		Principe actif photosensible à Administration immédiate	-	3 oui/3+labo	oui // Administration immédiate est recommandée car le PA est photosensible
Monicor LP 20,40 et 60 mg	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu (microgranules LP), Administration immédiate		7 oui/9 + labo	L'ouverture de la gélule est possible mais attention à ne pas écraser les microgranules qui sont à libération prolongée.
Mono-algic LP 100mg, 200mg et 300 mg	Comprimé à libération prolongée		-	Topalgic 100mg/ml, sol buv, fl. de 10ml	2non/2	
Mono tildiem LP 200mg et 300mg	Gélule à libération prolongée		A avaler rapidement, Ne pas broyer les microgranules gastro-résistantes, Prise pendant les repas	autres inhibiteurs calciques : Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium	4 oui/8 + labo	aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // L'ouverture ne peut être recommandée car c'est une forme LP //La gel contient des microgranules à libération immédiate et des microgranules à LP ce qui permet une rapidité d'action et le maintien de l'efficacité jusqu'à la 24ème heure // En cas de force majeure (déglutition; SNG) la gélule peut être ouverte à condition que la totalité des microgranules soit ingérée. La dissolution dans l'estomac et l'absorption risquent de ce fait d'être légèrement plus rapides
Monozeclar	Comprimé pelliculé à libération modifiée				2/2	pas d'info labo mais impossible car forme LP
Mopral 10 et 20mg	Gélule		Mélanger avec un aliment acide. Ne pas croquer les microgranules.	préférer l'inexium granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet-dose	5/5 + labo	L'enveloppe de la gélule de MOPRAL est formée de gélatine et sert à contenir les micro-granules elles-mêmes gastro-résistantes. Il est donc tout à fait possible d'ouvrir la gélule, ce qui est particulièrement fait pour une administration par sonde gastrique. Toutefois, il ne faut pas écraser les microgranules afin de conserver leur gastro-résistance.
Moscontin 10, 30, 60, 100 et 200mg	Comprimé enrobé à libération prolongée			Skénan LP sans écraser les granules	1non/1	pas d'info labo mais impossible car forme à libération prolongée
Motilium 10mg	Comprimé pelliculé		-	Motilium 1mg/ml, susp buv, fl. de 200ml ou Motiliumlingual 10mg, lyophilisat oral.	7 non/9 + labo	Aucune étude réalisée sur l'écrasement des cps et l'administration par SNG. Le labo ne le recommande pas.
Moxonidine 0,2mg et 0,4mg	Comprimé pelliculé		-	-	1 oui/1 +labo	Aucune donnée ne permettant d'écraser les cps
Muxol 30 mg	Comprimé sécable			Muxol 0,3% solution buvable	1 oui/2 + labo	Cp peut être écrasé sans modification du PA
Myambutol 400mg	Comprimé enrobé sécable		-	-	6oui/6	
Myfortic 180mg et 360mg	Comprimé gastro-résistant			-	1 non/2 + labo	Cps doivent être avalés entiers sans être croqués pour préserver l'enrobage gastro résistant
Myleran 2mg	comprimé pelliculé		PA cytotoxique. Si écrasement; à faire sous isolateur		1 non/1 + labo	Ce n'est pas une forme retard, et la biodisponibilité est quasiment inchangée. Il ne semble pas y avoir de problèmes pour écraser les cps. Ceci est à faire sous isolateur.
Mynocine 50 et 100mg	Microgranules en gélule				1oui/1 + labo	Ce n'est pas une forme à LP. Il est possible d'ouvrir les gélules et d'administrer les microgranules (sans toutefois les écraser), dans un verre d'eau ou dans un aliment mou type compote, yaourt. L'administration doit se faire de façon extemporanée.
Myolastan	Comprimé pelliculé sécable		Pelliculage permettant de protéger le PA de l'humidité, PA insoluble dans l'eau. A avaler sans croquer.	Autre myorelaxant: Thiocolchicoside comp	6non/6+labo	Aucune donnée sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // d'un point de vue galénique le pelliculage permet de protéger le tétrazepam de l'humidité // le tétrazepam est insoluble dans l'eau le cp écrasé ne pourra pas se dissoudre totalement
Mysoline 250mg	Comprimé sécable		D'après RCP "chez l'enfant de moins de 6ans, le cp doit être écrasé avant administration".	-	4oui/4	
Mytelase 10mg	Comprimé sécable		-	-	2oui/2	











Nabucox 500mg	Comprimé pelliculé		D'après RCP "à avaler entiers, sans être croqués ni mâchés, avec un peu d'eau".	Nabucox 1g dispersible	labo	Alternative par nabucox 1g forme dispersible
Naftilix 200mg	Gélule avec microgranules		D'après RCP "avaler la gélule sans la croquer ni l'ouvrir, toujours avec un grand verre d'eau".	-	1 oui/1 + labo	Les gélules sont à libération modifiée. De ce fait il n'est pas conseillé de disperser le contenu de la gélule dans un élément liquide avant l'administration car cela peut entraîner une modification des caractéristiques du produit.
Naprosyne 250, 500, 750 et 1000mg	Comprimé		D'après le RCP "les cps sont à avaler tels quels, avec un grand verre d'eau, au cours des repas".	Naprosyne 500mg suppositoires	1 non/1 + labo	Il n'est pas conseillé d'écraser les cps car il n'y a pas d'étude faite.
Naramig 2,5mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	autre triptan : Imigrane 20mg, solution nasale	2non/2	
Natulan 50mg	Gélule		-	-	2oui/2	
Navelbine 20mg et 30mg	Capsule molle		Ne pas croquer. Produit cytotoxique	-	1non/1	pas d'info labo mais produit cytotoxique donc impossible d'ouvrir la capsule
Neo mercazole 5mg et 20mg	Comprimé		A administrer au cours ou en fin de repas. Peu soluble dans l'eau	-	4oui/4	
Neo-codion	Comprimé enrobé			Neo-codion sirop adulte / enfant / nourrisson	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par néo-codion sirop
Neoral 10mg, 25mg, 50mg et 100mg	Capsule molle		Ne pas avaler avec du jus de pamplemousse	Neoral 100mg/ml, sol buv, fl. de 50ml	5non/5	
Neuleptil 10mg	Gélule			Neuleptil 1% ou 4% solution buvable en gouttes		pas d'info labo mais alternative possible par une forme buvable
Neuleptil 25 mg	Comprimé pelliculé sécable		PA photosensible	Neuleptil 1% ou 4% solution buvable en gouttes	2non/2 + labo	pas d'étude mais alternative par une solution buvable à 1% ou 4%
Neurontin 100mg, 300mg et 400mg	Gélule		A administrer au cours ou en fin de repas. Amertume	-	9 oui/11 + labo	Le labo ne recommande ni ne suggère la modification de l'intégrité galénique des gélules car c'est hors AMM //mais le précédent RCP précisait que l'ouverture était possible et que le contenu devait être mélangé à un aliment pour cacher l'amertume de la gabapentine// une étude scientifique faite chez 9 volontaires sains a conclu à une non modification de l'absorption après ouverture des gélules
Neurontin 600 et 800mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. A administrer au cours ou en fin de repas	Neurontin 100mg, 300mg et 400mg gélules	4 non/5 + labo	Il s'agit d'une utilisation hors AMM du médicament. Le labo n'entend ni suggérer ni recommander un recours à Neurontin dans une utilisation autre que celle décrite dans le RCP. Aucune étude n'a été faite cependant il y a eu des cas isolés où Neurontin a été administré avec succès à des enfants qui ne pouvaient pas avaler les gélules en entier, en dissolvant le contenu de la gélule dans une petite quantité d'eau. La gabapentine a un goût amer et, là encore dans des cas isolés, des sirops parfumés ont été utilisés pour en masquer le goût. Toute préparation liquide doit être utilisée immédiatement.
Nicobion 500mg	comprimé pelliculé		PA à goût amer et très colorant		9 oui/10	Aucune étude
Nifluril 250mg	Gélule		D'après le RCP "les gélules sont à avaler telles quelles avec un grand verre d'eau".	Nifluril 400mg et 700mg, suppositoires. Autre AINS: Apranax sachet, Feldene 20mg etc...	5 non/6 +labo	rien ne s'oppose à l'ouverture des gélules car elles ne présentent pas de galénique particulière mais le laboratoire n'a fait aucune étude de bioéquivalence (biodisponibilité, pharmacocinétique).
Nilevar 10mg	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	Aucune donnée sur les impacts en matière de biodisponibilité ou de pharmacocinétique.
Nimotop 30mg	Comprimé pelliculé		PA photosensible, Eviter contact PVC, Administration immédiate	-	1 non/6 + labo	L'écrasement des cps n'est pas recommandé car la nimodipine est photosensible // Le broyage augmente le risque d'altération // Alternative par une forme IV
Nisis 40, 80 et 160 mg	Comprimé pelliculé (40 mg est sécable)				1 non/1 + labo	Aucune étude
Nisisco 80/12,5mg, 160/12,5mg et 160/25mg	Comprimé pelliculé				1 non/1 + labo	Aucune étude
Nivaquine 100mg	Comprimé sécable		-	Nivaquine Sirop 25mg/5ml : flacon de 150 ml	1 oui/2 +labo	Cps peuvent être écrasés et mélangés dans yaourt ou liquide sucre // nivaquine existe sous forme de sirop // aucune donnée de cinétique sous forme écrasée ni pour patient porteur d'une SNG

RCP du 16/07/2010

RCP du 14/08/07

Nivaquine 300mg	Comprimé pelliculé			Nivaquine Sirop 25mg/5ml : flacon de 150 ml	labo	Cps peuvent être écrasés et mélangés dans yaourt ou liquide sucre // nivaquine existe sous forme de sirop // aucune donnée de cinétique sous forme écrasée ni pour patient porteur d'une SNG
Nizoral 200mg	Comprimé		A administrer au cours du repas	-	1 non/1 + labo	Pas d'étude de biodisponibilité suite à l'administration de comprimés broyés de Nizoral. Il est donc déconseillé de broyer les comprimés.
Nocertone 60mg	Comprimé pelliculé sécable				labo	aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // cp sécable a libération immédiate dont le pelliculage permet de masquer le goût et d'assurer la protection du noyau du cp contre l'humidité et la lumière // si le cp devait être écrasé il conviendrait de procéder dans des conditions ad hoc et pour une administration extemporanée // pas de donnée sur une administration par sonde gastrique
Noctamide 1mg et 2mg	Comprimé sécable		-	-	5oui/5	
Noctran 10mg	Comprimé sécable		Administrer le soir avant le coucher.	Autre hypnotique: Imovane comp, Théralène gttes buvable etc...	4 non/7 + labo	Aucune étude sur la biodisponibilité après broyage donc non recommandé// comprimé composé de 3 couches
Nolvadex 10mg	Comprimé pelliculé		 Administration extemporanée, protection nécessaire pour cytotoxiques, manipulation interdite chez la femme enceinte, protection de la lumière		5oui/5	
Nootropyl 800 mg	Comprimé pelliculé		Goût désagréable. D'après le RCP : "les cps sont à avaler sans être croqués, avec un peu d'eau".	Nootropyl solution buvable	2 oui/4 + labo	Possible dans un yaourt ou dans la confiture
Nordaz 7,5 et 15mg	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	Pas de problème a priori car il s'agit d'une forme à libération immédiate et le cp n'est pas pelliculé mais le labo n'a fait aucune étude sur ce mode d'administration et le PA est insoluble dans l'eau.
Noroxine 400mg	Comprimé enrobé		Principe actif amer. Ne pas prendre avec du lait ou des produits laitiers	Autres quinolones 2G : Ciflox sol buv, Oflozet	7 oui/9 + labo	Aucune donnée sur biodisponibilité stabilité et efficacité sur administration après écrasement // cp enrobé car le PA a un goût amer donc déconseillé
Norset 15mg	Comprimé pelliculé		Administrer de préférence au cours du repas du soir.	Norset 15mg/ml, sol buv, fl. de 66ml	1 oui/7 + labo	L'écrasement est possible // Il existe une alternative par une solution buvable
Norvir 100mg	Capsule molle			Norvir 80mg/ml, sol buv, fl. de 90ml	4 non/4	
Notezine 100mg	Comprimé sécable		-	-	1 oui/1 + labo	Le cp de NOTEZINE n'étant pas gastro-résistant, il est possible de l'écraser et de le dissoudre dans l'eau pour une administration extemporanée. Il n'existe aucune étude spécifique réalisée avec le cp de NOTEZINE écrasé. Aucune étude également chez le patient porteur de sonde gastrique.
Novatrex 2,5mg	Comprimé		Produit cytotoxique. Mesure de protection lors de la manipulation 		1 non/1 + labo	Aucune étude n'a été réalisée , le labo ne peut donc faire des recommandations// produit cytotoxique, lors de la manipulation, mesure de protection adéquate pour éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Novonorm 0,5mg, 1mg, 2mg	Comprimé		Avaler avec de l'eau avant les repas.		6oui/6	
Nozinan 25 et 100mg	comprimé pelliculé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas	Nozinan 4%, sol buv en goutte, fl.de 30ml	8 non/11 + labo	Aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps dans la mesure où il existe une alternative par une solution buvable a 4%

Odrik 0,5mg, 2mg, 4mg	Gélule		-	-	3 oui/3+labo	Aucune donnée sur efficacité et sécurité des gélules ouvertes
Ofloctet 200mg	Comprimé pelliculé sécable		Dissolution dans du jus de pomme, administration immédiate car sensible à la lumière et l'humidité	-	9oui/9	
Ogastoro 15mg et 30mg	Comprimé orodispersible		Dissoudre dans un peu d'eau ou laisser fondre sous la langue. Attention peut boucher la SNG bien rincer la sonde après administration	-	2oui/2	
Ogast 15 et 30mg	Gélule gastrorésistante		Ne pas écraser les microgranules	Ogastoro 15mg et 30mg cp orodispersible (attention peut boucher la SNG bien rincer la sonde après administration)	1 oui/1 + labo	préférer Ogastoro qui est une forme orodispersible. Ogastoro peut également être administré par l'intermédiaire d'une SNG.
Olmifon 300 mg	Comprimé pelliculé		administration immédiate car photosensible		4oui/4	
Omacor 1g	Capsule molle		ne pas ouvrir	-	3/3+labo	Capsules ne doivent pas être ouvertes car risque de modifier la pharmacocinétique et plus précisément la biodisponibilité
Omix LP 0,4mg	Gélule avec microgranules gastrorésistantes		Administration extemporanée. Ne pas écraser les microgranules. Ne pas croquer les microgranules.		1/1 + labo	Il est possible d'ouvrir la gélule mais il ne faut pas écraser ou croquer les microgranules qui sont à libération prolongée. L'ouverture de la gélule et la mise en solution des granules doit se faire de façon extemporanée, juste avant l'administration. Il est possible de les administrer par une SNG selon le même procédé.
Oracéfal 500 mg	Gélule		Ne pas ouvrir	Oracéfal 1g comprimé dispersible // Oracéfal poudre pour suspension buvable	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par une forme buvable ou par une forme dispersible
Oracilline 1 M UI	Comprimé sécable		A administrer à jeun	Oracilline 1MU/10ml, susp buv, fl. de 180ml	3 non/5 + labo	aucune donnée
Orap 1mg, 4mg	Comprimé		Ne pas croquer. Ne pas macher. Avaler avec de l'eau.	risperdal sol buvable	4 non/5+labo	Pas de donnée de biodisponibilité des cps écrasés donc ne peuvent être écrasés // alternative risperdal solution buvable
Orbenine 500mg	Gélule		A administrer 30 min avant le repas. D'après le RCP "les gélules doivent être avalées sans les ouvrir, avec un verre d'eau".	plus d'alternative sirop depuis le 23/05/2011	8 oui/8	
Orelox 100mg	Comprimé pelliculé		Photosensibilité, Goût désagréable, Prise pendant les repas	Forme pédiatrique : Orelox 8mg/ml, sol buv, fl. de 100ml	3 non/7 + labo	Aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps dans la mesure où il existe une alternative par une suspension buvable 40mg/5ml
Oroken 200mg	Comprimé pelliculé		-	Oroken 40mg/5ml et 100mg/5ml, poudre pr sol buv	7oui/7	
Oxeol 10mg	Comprimé sécable		-	-	7oui/7	
Oxycontin LP 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 80mg	Comprimé pelliculé		Stupéfiant, Forme à libération prolongée		4/4+labo	Intégrité impérieuse car forme LP et aucune alteration doit être apportée (risque de surdosage)
Oxynorm 5mg, 10mg, 20mg	Gélule				1 oui/3+labo	aucune donnée sur la pharmacocinétique ou clinique donc non recommandé bien que l'oxycodone soit hydrosoluble et que la gélule ne serve que de vecteur (sans action a priori sur la cinétique)
Ozidia LP 5 et 10 mg	Comprimé à libération prolongée		Ne pas croquer. Ne pas écraser. Forme à libération prolongée.		1 non/1 + labo	Les comprimés doivent être avalés entiers. Aucune étude n'a été menée pour évaluer la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance des cps écrasés ou pilés puis mélangés dans de l'eau ou dans d'autres diluants (compote de pomme, autres aliments). Pas de recommandations de la part du labo.
Paludrine 100mg	Comprimé sécable				1oui/1 + labo	Le dossier d'AMM ne contient pas d'étude spécifique de biodisponibilité ni de stabilité en cas d'écrasement du cp. Dans les "recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010" il est spécifié pour la chimioprophylaxie du Paludisme que "avant l'âge de 6 ans, les comprimés doivent être écrasés".
Pariet	Comprimé gastro-résistant				2non/2	

Parkinane LP 2mg et 5mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Artane 0.1mg/gtte, sol buv en gouttes, fl. de 30ml	6 non/7	pas d'info labo mais alternative possible par une forme buvable
Parlodel 2,5mg	Comprimé sécable		Administrer au cours d'un repas.		2 oui/3	Le labo ne peut recommander le fait de broyer les cps, dans la mesure où cela n'est pas validé par l'AMM, et dans la mesure où il peut se produire des phénomènes de surchauffe du comprimé.
Parlodel 5 et 10mg	Gélule		Administrer au cours d'un repas.		1 oui/1	Il est possible d'ouvrir les gélules. Cependant, ne disposant pas d'éléments de stabilité, cette pratique ne peut être envisagée que si la préparation est utilisée de façon extemporanée et, bien entendu, s'il n'y a pas de possibilité de faire autrement.
Peflacine 400mg	Comprimé pelliculé sécable	 uniquement si administration par SNG	PA photosensible		1 oui/1 + labo	Le pelliculage des cps sert à masquer l'amertume et à préserver le produit actif de la lumière. Il est théoriquement possible d'écraser ces cps malgré le pelliculage pour une éventuelle administration par sonde gastrique. Le produit étant sensible à la lumière, l'administration doit être immédiate. Toutefois, il n'y a pas de donnée pharmacocinétique avec les cps écrasés.
Pentasa 500mg	Comprimé		Ne pas croquer	Pentasa 1g, susp rectale, fl. de 100ml ou Pentasa 1g granules sachet	4non/4 + labo	L'écrasement des comprimés n'est pas possible en raison d'un enrobage pour libération contrôlée de la substance active sur toute la longueur de l'intestin. Il n'existe pas d'alternative étant donné que les formes rectales sont plutôt réservées aux localisations rectales ou rectosigmoïdiennes basses des poussées légères ou modérées de rectocolite hémorragique.
Pentoxifylline 400mg	Comprimé pelliculé		forme LP : ne pas écraser	Autre antischémique : buflomédil	2 non/2 + labo	Aucune donnée ne permettant d'écraser les cps
Pepdine 20 et 40mg	Comprimé pelliculé				1 non/2 + labo	Aucune étude.
Periactine 4mg	Comprimé		A administrer le soir	-	4 oui/4	
Perindopril 2, 4 et 8 mg	Comprimé				2oui/2	
Peristaltine 100 mg	Comprimé enrobé				2 oui/3 + labo	Ces cps sont enrobés. L'enrobage est sucré, épais, mais non gastro-résistant. Le temps moyen de délitement des cps à pH acide est de 30 à 40 minutes. Les principes actifs de PERISTALTINE agissent pour partie après avoir été absorbés au niveau de l'intestin grêle et pour partie après avoir été métabolisés par la flore bactérienne colique. Etant donné ces sites d'absorption et d'action, même si l'écrasement des cps peut modifier le délai de libération des PA, ceci ne devrait pas se traduire par des perturbations notables de leurs effets cliniques. Aucune info disponible sur la stabilité des pdts préparés à partir des cps écrasés.
Permixon 160mg	Gélule		goût amer		3 oui/4	Le labo ne recommande pas l'ouverture des gélules car il ne possède pas d'étude de cinétique. De plus, cela risquerait d'accroître les troubles digestifs, et ainsi de diminuer l'observance.
Persantine 75mg	Comprimé enrobé		Forte amertume et fort pouvoir colorant	Cléridium comp	3 oui/6 + labo	Pas de donnée sur la cinétique et l'efficacité chimique sur l'écrasement des cps// enrobage en raison d'une forte amertume et d'un fort pouvoir colorant du dipyridamole.
Phenergan 25 mg	Comprimé enrobé			Phenergan 0,1% sirop (qui peut être utilisé dans le traitement des manifestations allergiques diverses)	1 non/1 + labo	pas d'infos sur la possibilité d'écraser ou non les comprimés
Physiotens 0,2mg, 0,4mg	Comprimé pelliculé				4oui/4	
Pipram fort 400mg	Comprimé enrobé		-	-	6oui/6	
Pirilène 500mg	Comprimé sécable		-	-	7oui/7	
Plaquenil 200mg	Comprimé pelliculé		Forte amertume du PA. A administrer au cours ou en fin de repas	-	5 oui/6 + labo	Pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques et sur la tolérance. Les cps sont pelliculés pour masquer la très forte amertume du PA

Plavix 75mg, 300mg	Comprimé pelliculé		A administrer à heure fixe, Principe actif sensible à la lumière	-	11/11	
Plitican	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	Aucune étude spécifique réalisée avec les cps de PLITICAN écrasés.
Pneumorel 80mg	Comprimé enrobé		prise en début de repas	Pneumorel 0,2%, sirop, fl. de 150ml	3 non/5 + labo	Forme considérée comme LP car cp drageifié donc risque d'accélérer la cinétique et d'exercer un effet pharmacodynamique excessif
Polaramine 2mg	Comprimé sécable		-	Polaramine sirop 0,5mg/ml	1 oui/4 + labo	L'écrasement est possible // Cp sécable // Il existe une alternative par un sirop
Polaramine Repetabs LP 6mg	Comprimé enrobé		-	Polaramine 2mg, comprimé	labo	Il est déconseillé de les écraser car du fait de la forme galénique, la biodispo en serait modifiée // Il existe une alternative par un sirop
Ponstyl	Gélule				1 non/1 + labo	Aucune étude n'a été menée pour évaluer la pharmacocinétique, la stabilité, l'efficacité ou la tolérance après ouverture des gélules et mélange du contenu dans de l'eau ou dans d'autres diluants (compote de pomme, autres aliments). Pas de recommandations de la part du labo.
Pradaxa 75 et 110mg	Gélule				labo	pas recommandé d'ouvrir la gélule car aucune étude n'a été réalisée
Praxilene 200 mg	Comprimé pelliculé		Irritant pour l'œsophage		2 non/7 + labo	Non car effet anesthésiant local du nafdofuryl
Praxinor	Comprimé pelliculé			Heptamyl sol buvable	1non/1 + labo	il n'est pas possible de broyer les comprimés (cps pelliculés)
Prazinil 50mg	Comprimé pelliculé				1 oui/1	Le labo ne recommande pas l'écrasement des cps car il ne possède pas d'étude de cinétique avec la forme écrasée du Prazinil.
Prestole 50mg/25mg	Gélule		diluer la poudre dans de l'eau et boire immédiatement	-	5oui/5	
Preterax 2mg/0,625mg	Comprimé sécable		A administrer le matin ou avant un repas.	-	6oui/6 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Previscan 20mg	Comprimé quadrisécable		A administrer à heure fixe, changement de couleur mais aucune modification sur l'efficacité, prise pendant le repas, éviter les aliments riches en vit K (brocoli, carote..)	-	10 oui/11 + labo	Pas d'étude, pas recommandé par le labo d'écraser les comprimés.
Prezista 300mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer.	-	2non/2	
Primalan 5mg, 10mg	Comprimé sécable		-	Primalan sirop, fl. de 60ml	2non/2+labo	Risque de modifier la pharmacocinétique et plus précisément la biodisponibilité
Primperan 10mg	Comprimé sécable		A administrer 30 min avant le repas	Primperan sol buvable (0,1%, sol buv, fl. de 200ml) ou suppo	5 non/8 + labo	Aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il existe des alternatives à l'écrasement: chez l'adulte, sirop a 0,1% (nausées et vomissements non induits par les antimotilitiques) ou le suppositoire a 10mg. Chez l'enfant, suppositoire a 10mg si nausées et vomissements induits par les antimotilitiques ou sinon gouttes a 2,6mg/ml
Pritor 20, 40 et 80mg	Comprimé				labo	Les cps ne sont pas sécables // le PA est sensible a l'air et à l'humidite donc le broyage est source d'altération
Pritorplus 40mg/12,5mg, 80 mg/12,5 mg et 80mg/25mg	Comprimé bicouche				labo	Les cps ne sont pas sécables // le PA est sensible a l'air et à l'humidite donc le broyage est source d'altération
Procoralan 5mg et 7,5mg	Comprimé pelliculé		dissolution possible sauf avec du jus de pamplemousse, pas de mélange avec d'autres médicaments	-	4 oui/4+labo	Possibilité dissoudre dans un verre d'eau coca ou jus orange mais exclure jus de pamplemousse ou écraser dans compote mais éviter le lait et/ou le fromage blanc. administration possible apres broyage et mise en suspension la cinétique de libération du principe actif des cps broyés sera peu modifiée le temps de délitement du cp en milieu gastrique artificiel étant inférieur à 30 min // ne pas mélanger poudre procoralan avec med de phytothérapie

Profenid 50mg	Gélule		PA photosensible	Profenid suppo, Nureflex	2oui/2 + labo	D'un point de vue galénique il est exceptionnellement possible d'ouvrir les gélules // aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques donc non conseillé
Profenid 100mg	Comprimé pelliculé		PA photosensible, A administrer au cours ou en fin de repas	Profenid suppo, Nureflex	2 oui/3 + labo	Aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // D'un point de vue galénique il est exceptionnellement possible d'écraser les cps mais l'utilisation doit être extemporanée car le PA est photosensible // Aucune donnée sur l'administration par sonde
Profenid LP 200mg	Gélule		PA photosensible Ne pas écraser les microgranules	Profenid suppo, Nureflex	1 oui/1 + labo	Forme LP assurée par l'enrobage des microgranules contenus dans la gélule et non par la gélule elle-même donc d'un point de vue galénique il est exceptionnellement possible de les ouvrir et d'avaler les granules sans les croquer // Mais aucune étude sur ce mode d'administration donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques donc non recommandé // Aucune donnée sur une administration par sonde
Profenid LP 200mg	Comprimé enrobé à libération prolongée		Ne pas croquer. A administrer au cours ou en fin de repas	Profenid 100mg, suppositoire	1 non/1	pas d'info labo mais impossible car forme LP
Proglicem 25mg et 100mg	Gélule		Insoluble dans l'eau. Pour les nourrissons et enfants de moins de 6 ans, le contenu des gélules peut être mélangé à des aliments.	-	3oui/3	
Prograf 0,5mg, 1mg et 5mg	Gélule		prise à jeun	-	3oui/3	
Proracyl 50 mg	Comprimé		Sous hotte aspirante 		labo	Sous hotte aspirante
Prothiaden 25 mg	Gélule				2oui/2	
Prothiaden 75mg	Comprimé enrobé		-	-	3oui/3	
Prozac 20mg	Comprimé dispersible sécable		Ne pas croquer. Administrer au cours ou en dehors des repas.	Prozac 20mg/5ml, sol buv, fl. de 70ml	7oui/7	
Prozac 20mg	Gélule			Prozac 20mg/5ml, sol buv, fl. de 70ml	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par une solution buvable
Purinethol 50mg	Comprimé sécable		A administrer à jeun Produit cytotoxique	-	2non/2	
Pyostacine 500mg	Comprimé pelliculé sécable		mélanger avec un aliment ou du lait	-	10oui/10	
Quinimax 125mg, 500mg	Comprimé pelliculé sécable		-	-	4oui/4	
Rapamune 1mg et 2mg	Comprimé enrobé		Ne pas avaler avec du jus de pamplemousse	Rapamune 1mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	3non/3	
Rasilez 150 et 300mg	Comprimé pelliculé		-	-	1 non/1 + labo	Aucune donnée sur le modification éventuelle de l'absorption et de la biodisponibilité. Toutefois, si aucune autre alternative thérapeutique n'est possible, voici quelques informations utiles : ce n'est pas une forme LP ni GR / il y a risque de perte de PA au moment du broyage / le PA a un goût très amer / le cp broyé serait à administrer de façon extemporanée sur un aliment semi-solide (surtout ne pas dissoudre au préalable) / pour la manipulation du produit, tenir compte des données de sécurité pré-cliniques mentionnées dans le Vidal / Ce mode d'utilisation reste sous votre entière responsabilité.
Rebetol 200mg	Gélule		-	Rebetol 40mg/ml, sol buv, fl. de 100ml	1 non/3 + labo	Il est déconseillé de les ouvrir car effets toxiques et tératogènes // Il existe une alternative par une solution buvable
Relpax 20mg et 40mg	Comprimé pelliculé			autre triptan : Imigrane 20mg, solution nasale	1 non/1 + labo	Pas de données sur la possibilité d'écraser les cps et d'administrer les cps broyés par sonde de nutrition entérale. Le labo ne recommande ni ne suggère l'écrasement des cps en vue de leur administration par sonde.

Reminyl 4mg, 8mg et 12mg	Comprimé pelliculé		-	Reminyl 4mg/ml, sol buv, fl. de 100ml	5 non/7+labo	Pas de donnée de biodisponibilité des cps écrasés donc ne pas administrer sous cette forme
Reminyl LP 8mg, 16mg, 24 mg	Gélule		Ne pas croquer	Reminyl 4mg/ml, sol buv, fl. de 100ml	4non/4	
Renagel 800mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	-	2non/2	
Renitec 5 et 20mg	Comprimé sécable		PA hygroscopique et photosensible, Dégradation du PA en milieu acide		3non/3	
Requip 0,25mg, 0,50mg, 1mg, 2mg, 5mg	Comprimé pelliculé		administration immédiate, prise pendant le repas		4oui/4	
Requip LP 2mg, 4mg et 8mg	Comprimé pelliculé à libération prolongée		-	Requip 1mg, 2mg et 5mg comprimé	1 non/1	pas d'info labo mais forme à LP donc impossible d'écraser les cps
Retrovir 100mg et 250mg	Gélule			Retrovir 10mg/ml, sol buv, fl. de 200ml	5non/5	
Retrovir 300mg	Comprimé pelliculé			Retrovir 10mg/ml, sol buv, fl. de 200ml	4non/4	
Revatio 20mg	Comprimé pelliculé		-	-	1 oui/1 +labo	Aucune donnée pharmacocinétique donc non recommandé par le labo // recherche biblio a montré : bonne conservation des suspensions buvables de sildenafil pilé mis en suspension dans un sirop simple de glucose conservées soit au réfrigérateur soit a t °c ambiante.
Revia 50mg	Comprimé pelliculé sécable				2oui/2	
Revlimid 5, 10, 15 et 25mg	Gélule		Produit cytotoxique	-	1non/1	pas d'info labo mais impossible car PA cytotoxique
Reyataz 150mg, 200mg, 300mg	Gélule			-	2non/2	
Rhinadvil	Comprimé enrobé		D'après le RCP "les cps sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, de préférence au cours des repas".		1 non/1 +labo	Aucune étude n'a été faite donc le laboratoire déconseille d'écraser les cps.
Rifadine 300mg	Gélule		A administrer 30 min avant le repas	Rifadine 2%, susp buv, fl. de 120ml	2 oui/6 + labo	Il est possible d'ouvrir les gélules mais aucune étude sur la biodisponibilité // En l'absence de suspension disponible il est possible de solubiliser la poudre dans l'eau pour pouvoir mieux doser le produit
Rifater 120mg/50mg/300mg	Comprimé enrobé		A administrer 30 min avant le repas	-	2 oui/2 +labo	En théorie possibilité de les écraser// pas étude de biodisponibilité comparative du cp enrobé et cp écrasé (goût amer)
Rifinah 150mg/300mg	Comprimé enrobé		A administrer 30 min avant le repas	-	1 oui/8 + labo	L'enrobage ne modifiant pas la biodisponibilité des PA, le cp réduit en poudre peut être utilisé. Toutefois il n'existe pas d'étude comparative entre la biodisponibilité du cp enrobé et celle du cp écrasé.
Rilutek 50mg	Comprimé pelliculé				1 oui/1 + labo	Aucune donnée sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // point de vue galénique le cp est enrobé et non sécable
Rimactan 300 mg	Gélule			RIFADINE 100mg/5ml solution buvable	2non/2	
Rimifon 50mg et 150mg	Comprimé		A administrer le matin à jeun	-	8oui/8	
Risordan 20 mg	Comprimé sécable				2 non/3 + labo	cp a libération immédiate mais de durée d'action prolongée // selon le RCP les cps doivent être avalés directement sans les croquer ni les sucer
Risperdal 1mg et 2mg	Comprimé pelliculé sécable		-	Risperdal 1mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	6 non/8+labo	Pas étude de biodisponibilité des cp écrasés. Pelliculage masque le goût amer des cps , il est déconseillé d'écraser les cp // alternative solution buvable
Risperdaloro 0,5mg et 1mg	Comprimé orodispersible		Laisser fondre le comprimé sur la langue	Risperdal 1mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	4oui/4	
Ritaline 10mg	Comprimé sécable			-	1 oui/1 +labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable.

Ritaline LP 20mg et 30mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu, mélanger avec un aliment froid	-	1non/1 +labo	Contenu peut être dispersé sur nourriture dont la consistance est semi-solide (ex : compote). Aliments ne doivent pas être chauds car risque altération des propriétés de libération du PA // le mélange (contenu de la gel et aliments) doit être avalé immédiatement et entièrement. Ce mélange ne doit pas être conservé pour usage ultérieur
Rivotril 2mg	Comprimé sécable		-	Rivotril 2,5mg/ml, sol buv, fl. de 20ml	4 oui/8 + labo	Aucune étude car alternative par une solution buvable
Rocaltrol 0,25 µg	Capsule molle				2 non/3 + labo	Aucune étude
Rodogyl	Comprimé pelliculé				1 oui/1 + labo	Les cps ne sont pas gastro-résistants, ils est donc possible de les écraser pour une administration par sonde entérale. Cependant il n'y aucune étude spécifique réalisée avec les cps écrasés ni par sonde. Pas de garantie que les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, ainsi que la tolérance, restent inchangés lors de l'administration de cps écrasés.
Rohypnol 1mg	Comprimé pelliculé sécable		-	-	6 oui/7 + labo	Aucune étude
Rovalcyte 450mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Produit cytotoxique	ROVALCYTE 50mg/ml poudre pour suspension buvable	2non/2	
Rovamycine 1,5 et 3 mui	Comprimé pelliculé		D'après le RCP "les cps sont à avaler tels quels avec un verre d'eau".	Rovamycine sirop 0,375 MUI/5ml Autres macrolides : Erythrocline sol buv, Josacine sol buv, Zeclar sol buv, Zithromax sol buv	7 non/8 + labo	Pas d'études réalisées // ne veulent pas envoyer une confirmation écrite mais pratique assez courante // cp à simple pelliculage
Rowasa 250 et 500mg	Comprimé enrobé gastro-résistant				labo	CP GR // cette GR permet d'éviter toute destruction du PA dans l'estomac (site d'action: intestin grêle et colon)
Rulid 100 et 150 mg	Comprimé enrobé		administrer avant les repas	Rulid oral 50mg cp sécable pour susp buvable (faire fondre dans un verre d'eau) Autres macrolides : Erythrocline sol buv, Josacine sol buv, Zeclar sol buv, Zithromax sol buv	7 non/9 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps 100mg et 150mg écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps dans la mesure où il existe une alternative : Rulid 50mg cp sécable pour suspension buvable
Rythmodan 100mg	Gélule		Ne pas écraser le contenu	-	4 oui/4+labo	Absence d'étude donc non recommandé
Rythmodan LP 250mg	Comprimé enrobé		Ne pas croquer	Rythmodan 100mg, gélule	4/4+labo	Non car forme LP
Rythmol 300mg	Comprimé enrobé sécable		-	-	8oui/8	
Sabril 500mg	Comprimé pelliculé sécable		A administrer toujours à la même heure	Sabril 500mg, poudre pour solution buvable en sachet	2 oui/3 + labo	Les cps de SABRIL doivent être avalés, entiers ou par demi-comprimés, avec au moins un demi-verre d'eau. En cas de besoin, il est recommandé de recourir à la forme "granulés pour suspension buvable en sachet".
Salazopyrine 500mg	Comprimé enrobé gastro-résistant		Ne pas croquer	Autres anti-inflammatoires (rectocolite): Pentasa 1g susp rectale fl 100ml	4non/4	
Salbumol 2 mg	Comprimé			Salbumol suppo	3 non/4 + labo	Aucune étude donc non recommandé par le labo
Sandimmun 25mg, 50mg, 100mg	Capsule molle		Ne pas avaler avec du jus de pamplemousse	Sandimmun 100mg/ml, sol buv, fl. de 50ml	2non/2	
Sanmigran 0,5mg	Comprimé enrobé		-	-	1 oui/1 + labo	Aucune donnée sur la modification éventuelle de l'absorption et de la biodisponibilité. Toutefois, si aucune autre alternative thérapeutique n'est possible, voici quelques informations utiles : ce n'est pas une forme LP ni GR / il y a risque de perte de PA au moment du broyage / le cp broyé serait à administrer de façon extemporanée sur un aliment semi-solide (surtout ne pas dissoudre au préalable) / pour la manipulation du produit, tenir compte des données de sécurité pré-cliniques mentionnées dans le Vidal / ce mode d'utilisation reste sous votre entière responsabilité.
Savarine 200mg/100mg	Comprimé pelliculé		Principe actif amer	Nivaquine 5mg/ml, sirop, fl. de 150ml + Proguanil 100mg, comprimé écrasable	2non/2	

RCP du
21/01/2011

Sectral 200mg et 400mg	Comprimé pelliculé		Administration extemporanée. Ne pas croquer	Sectral 40mg/ml, sol buv, fl. de 125ml	4 oui/9+labo	Aucune donnée sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // mais cps à libération immédiate donc possibilité de les écraser finement en utilisation extemporanée mais pas d'info sur la biodisponibilité de cette préparation // goût désagréable car pelliculage rompu
Sectral LP 500mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	Sectral 40mg/ml, sol buv, fl. de 125ml	4non/4	
Seglor 5 mg	Gélule			Seglor 5mg lyophilisat oral (à laisser fondre sous la langue ou à diluer dans un 1/2 verre d'eau) Dihydroergotamine buvable	2non/2	
Seloken 100mg	Comprimé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas	-	5/5+labo	Mais pas AMM pour ce type d'administration // produit ayant formulation galénique à libération immédiate et que techniquement rien ne s'oppose à écrasement ou pulvérisation
Seloken LP 200mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. A administrer au cours ou en fin de repas	Seloken 100mg, comprimé	7non/7	
Selokoz LP 23,75, 95 et 190mg	Comprimé pelliculé à libération prolongée (sécable pour le 23,75mg)				labo	Le cp ne peut être ni concassé, ni broyé. La formulation galénique est donnée grâce à une matrice poreuse inerte sur laquelle vient adhérer le principe actif, qui ne doit pas être détruite.
Semap 20mg	Comprimé		-	-	2non/2	
Serc 8mg	Comprimé		D'après le RCP "les cps doivent être avalés sans être croqués avec un verre d'eau au cours des repas" (la prise au cours des repas permet d'éviter les gastralgies).		3 oui/4 + labo	Il est possible de les écraser mais aucune étude,
Serecor LP 300 mg	Gélule		attention à ne pas broyer les microgranules gastrorésistants		4oui/4	
Seresta 10mg et 50mg	Comprimé sécable		-	-	11oui/11	
Sermion 5 et 10 mg	Gélule				2oui/2	
Seroplex 10mg et 20mg	Comprimé pelliculé sécable		Broyer le comprimé, pas de jus de pamplemousse	Seropram 40 mg/mL, sol buv, fl. de 12 mL à Attention à la posologie	4 oui/5+labo	Aucune donnée // les caractéristiques galéniques ne laissent pas présager d'une différence importante sur la pharmacocinétique du produit ; le rôle du pelliculage servant à masquer le goût amer du PA // à diluer dans eau de façon extemporanée en évitant de diluer dans jus de pamplemousse qui peut augmenter la biodisponibilité de certains composés
Seropram 20mg	Comprimé pelliculé sécable		PA amer, Prise en dehors des repas	Seropram 40mg/ml, sol buv, fl. de 12ml	5 oui/7 + labo	Non recommandé car aucune donnée // mais le pelliculage n'est pas GR donc il ne devrait pas y avoir de conséquence sur l'absorption // alternative par une forme buvable à 40mg/ml
Sertraline 25mg et 50mg	Gélule		-	-	1 oui/1 +labo	Aucune donnée ne permettant d'ouvrir les gélules
Sevredol 10mg et 20mg	Comprimé pelliculé sécable		Stupéfiant	Actiskénan 10mg et 20mg, gélules	2non/2	
Sibelium 10 mg	Comprimé sécable				1 non/1 + labo	Nous ne disposons d'aucune information relative à la biodisponibilité des comprimés après écrasement. Il est donc déconseillé d'écraser les comprimés. Les comprimés sont sécables.
Sifrol 0,18mg et 0,7mg	Comprimé sécable à libération immédiate		-	-	2 non/2+labo	Pas de donnée sur la cinétique et efficacité clinique
Sifrol LP 0,26 - 0,52 - 1,05 et 2,1 mg	Comprimé à libération prolongée				labo	Forme galénique à LP permet absorption régulière et soutenue dans le temps du PA d'un médicament // les cps ne doivent pas être machés, coupés ou écrasés.
Simvastatine 20mg et 40mg	Comprimé pelliculé		-	Autres statines : Tahor, Pravastatine	2non/2+labo	Aucune donnée ne permettant d'écraser les cps
Sinemet 100mg/10mg et 250mg/25mg	Comprimé sécable		administration immédiate, prise en fin de repas ou avant la prise de nourriture		12 oui/13 + labo	Pas d'étude

Sinemet LP 100mg/25mg et 200mg/50mg	Comprimé à libération prolongée		Ne pas croquer, ni mâcher.	Modopar cp dispersible	8non/8	
Singulair 5mg	Comprimé à croquer				3oui/3	
Singulair 10mg	Comprimé pelliculé			Singulair 4mg sachets-dose : Les granulés peuvent être administrés directement dans la bouche ou mélangés avec une cuillère de nourriture de préférence semi-liquide froide ou à température ambiante (compote de pommes, glace, carottes et riz par exemple).	3 oui/4	pas d'info labo mais alternative par Singulair 4mg sachets-dose ou Singulair 5mg cps à croquer
Sintrom 4mg	Comprimé sécable		A administrer à heure fixe	-	2 non/8+labo	Possible d'un point de vue galénique, mais aucune donnée quand à la modification éventuelle de la biodispo. Marge thérapeutique étroite donc risque important de perte du PA.
Skenan LP 10mg, 30mg, 60mg et 100mg	Gélule			-	10oui/10	Stupéfiant. D'après le RCP "dans le cas où les gélules ne peuvent être avalées, leur contenu peut être administré directement dans une alimentation semi-solide (purée, confiture, yaourt), ou encore dans des sondes gastriques ou de gastrostomie de diamètre supérieur à 16 F.G. à extrémité distale ouverte ou à pores latéraux. Un rinçage de la sonde avec 30 à 50 ml d'eau est suffisant".
Sodium chlorure 250 mg, 1g	Gélule			sachet poudre 1 g	3oui/3	
Solian 100mg, 200mg et 400mg	Comprimé sécable (pelliculé pour le 400mg)		Ne pas croquer. Ne pas mâcher. Administrer avec de l'eau.	Solian 100mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	6 non/9+labo	Pas de raison d'écraser les cps car existe la solution buvable 100 mg/ml
Sophidone LP 4mg, 8mg, 16mg et 24mg	Gélule		Stupéfiant. Ne pas écraser le contenu	-	5 oui/6+labo	Possibilité d'ouvrir les gélules et d'administrer le contenu dans alimentation semi solide; mais les granules ne doivent pas être écrasés pilés ou machés car risque de surdosage
Soriatane 10mg, 25mg	Gélule				2oui/2	
Sotalex 80mg et 160mg	Comprimé sécable		-	-	9 oui/11+labo	Le réduire en poudre
Spasfon 80mg	Comprimé enrobé		-	Spasfon lycoc 80mg, lyophilisat	3 oui/7 + labo	Galénique ne s'oppose pas mais aucune étude // goût amer // administration extemporanée
Spasfon lycoc 80mg	Lyophilisat oral		A dissoudre dans l'eau ou à faire fondre sous la langue	-	7oui/7	
Speciafoldine 0,4mg et 5mg	Comprimé		-	-	9oui/9	
Sporanox 100mg	Gélule		D'après RCP "les gélules doivent être absorbées sans être ouvertes, immédiatement après un repas, de préférence en une seule prise".	Sporanox 10mg/ml, sol buv, fl. de 150ml	3 non/4	pas d'info labo mais alternative possible
Stablon 12,5 mg	Comprimé enrobé		A administrer au début du repas	-	11oui/11 + labo	Peut être administrés en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Stagid 700mg	Comprimé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas	-	7 oui/7	
Stalevo tous dosage	Comprimé pelliculé			Association	3 oui/5 + labo	Aucune donnée mais les cps ne sont ni gastro-résistant ni LP donc c'est normalement possible // risque de perdre de la poudre // administration extemporanée sur un aliment semi-solide (ne pas dissoudre au préalable)

Stilnox 10mg	Comprimé sécable		administration immédiate car photooxydation	-	8 oui/9 + labo	Pelliculage opaque qui protège de la lumière/ le zolpidem se dégrade à la lumière les produits de dégradation entraînent un jaunissement de la poudre donc instabilité à la lumière// interactions chimiques peuvent se produire entre excipients des produits et entraîner des précipités
Stromectol 3mg	Comprimé		A administrer à jeun. Chez l'enfant de moins de 6 ans, les cps seront écrasés avant d'être avalés.	-	4oui/4	
Subutex 0,4mg, 2mg, 8mg	Comprimé sublingual		Laisser fondre le comprimé sous la langue	-	4non/4	
Sulfarlem 12,5mg et s25 25mg	Comprimé enrobé		administration avant le repas	-	1 non/8 + labo	Aucune étude n'a été faite mais le laboratoire recommande de ne pas l'écraser (cp pelliculé)
Surbronc expectorant 30mg	Comprimé sécable			Surbronc expectorant Ambroxol 0,6% sans sucre, sol buv, fl.100ml	1 non/2 + labo	pas d'étude faite
Surgam 100mg	Comprimé sécable		A avaler tels quels ou dissous dans un grand verre d'eau.	-	4oui/4	
Surmontil 25 et 100 mg	Comprimé (pelliculé sécable pour le 100mg)			Surmontil buvable	3 non/5 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps 25mg et 100mg écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps dans la mesure où il existe une alternative par une solution buvable a 4%
Sustiva 200mg	Gélule		A administrer à jeun.	Sustiva 30mg/ml, sol buv, fl. de 180ml	5non/5	
Sustiva 600mg	Comprimé pelliculé		A administrer à jeun.	-	2non/2	
Synedil 50mg	Gélule			solution buvable à 0,5g/100ml	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par une solution buvable
Synedil fort 200mg	Comprimé			solution buvable à 0,5g/100ml		pas d'info labo mais alternative possible par une solution buvable
Tadenan 50mg	Capsule molle		A administrer 30min avant le repas	-	4 non/6 + labo	Non recommandé par le labo // Le contenu de la capsule est une suspension huileuse // pb de l'intégrité de la dose et de l'incorporation à des produits hydrophiles // Mais pas d'études réalisées
Tagamet 200, 400 et 800mg	Comprimé pelliculé			Tagamet effervescent 200mg et 800mg	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par une forme effervescente
Tahor 10mg, 40mg, 80mg	Comprimé pelliculé		-	-	9oui/9	
Tamiflu 30, 45 et 75mg	Gélule			Poudre pour suspension buvable à 12 mg/ml. Après reconstitution avec 52 ml d'eau, le volume de suspension buvable utilisable correspond à un total de 10 doses d'oseltamivir 75 mg.	1 oui/3 + labo	Il est précisé dans le RCP : "Lorsque les dosages appropriés de gélules sont disponibles, la dose est obtenue en ouvrant la gélule et en mélangeant son contenu avec au maximum une cuillère à café d'un aliment sucré approprié. Le goût amer peut être masqué par des produits comme par exemple : de l'eau sucrée, du chocolat liquide, du sirop de cerises, du coulis pour dessert (comme une sauce caramel ou chocolat). La préparation doit être mélangée et administrée au patient dans sa totalité. Le mélange doit être immédiatement avalé après sa préparation,"
Tamoxifene 10mg et 20mg	Comprimé pelliculé sécable		Ne pas faire manipuler par femme enceinte se protéger avec gants et masque adm. aussitôt après écrasement et mise en suspension 	-	3/5+labo	oui
Tanakan 40mg	Comprimé enrobé		prise pendant le repas	Tanakan 40mg/ml solution buvable	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par Tanakan solution buvable
Tanganil 500mg	Comprimé		-	-	8oui/8	

Tarceva 100mg et 150mg	Comprimé pelliculé		-	-	2 oui/3+labo	Aucune donnée de pharmacocinétique // suite à une étude possibilité de dissoudre les cps dans eau stérile et de secouer pour obtention solution homogène lors d'une administration par SNG mais cela reste sous entière responsabilité du prescripteur
Tardyferon B9	Comprimé enrobé		-	Fumafer poudre orale	5 non/7	Les cps ne doivent pas être broyés, au risque de modifier la biodisponibilité de la spécialité. En effet, les cps sont formulés spécifiquement pour une bonne absorption au niveau duodénal et de la partie proximale du jéjunum. De plus, le goût après broyage serait vraiment désagréable et ne permettrait pas une bonne observance du traitement.
Tardyferon 80mg	comprimé enrobé					Les cps ne doivent pas être broyés, au risque de modifier la biodisponibilité de la spécialité. En effet, les cps sont formulés spécifiquement pour une bonne absorption au niveau duodénal et de la partie proximale du jéjunum. De plus, le goût après broyage serait vraiment désagréable et ne permettrait pas une bonne observance du traitement.
Tareg 40mg, 80mg et 160mg	Comprimé pelliculé		-	-	4 non/5+labo	Cp peut être coupé en 2// aucune donnée sur modification éventuelle de l'absorption et biodisponibilité // le PA est insoluble dans eau et a un goût amer
Tarka LP 180mg/2mg	Comprimé pelliculé à libération prolongée		Ne pas croquer	autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicornium	2non/2	pas d'info labo mais impossible car forme à LP
Tavanic 500mg	Comprimé pelliculé sécable		Administration extemporanée	-	5oui/5+labo	Enrobage n'est pas gastroresistant donc possibilité de les écraser mais utilisation à faire de façon extemporanée car le PA est sensible à la lumière // aucune étude de pharmacocinétique
Tegretol 200 mg	Comprimé pelliculé sécable		-	Tegretol 20mg/ml, susp buv, Fl. de 150ml	1 oui/8+labo	Cp peut être coupé en 2 // existe forme buvable
Tegretol LP 200 mg, 400mg	Comprimé pelliculé sécable à libération prolongée		Ne pas croquer. Ne pas macher. Administrer pendant ou après un repas.	Tegretol 200mg	9non/9+labo	Ne pas croquer ni écraser car il s'agit d'une forme LP et la cinétique serait modifiée.
Telzir 700mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer.	Telzir 50mg/ml, sol buv, fl. de 225ml	2non/2	
Temerit 5mg	Comprimé quadrisécable		-	-	4oui/4	
Temesta 1mg et 2,5mg	Comprimé sécable		-	-	10oui/10	
Temgesic 0,2mg	Comprimé sublingual		Ne pas croquer. Laisser fondre sous la langue	-	5non/5	
Temodal 5mg, 20mg, 100mg et 250mg	Gélule		Ne pas croquer. Produit cytotoxique	-	2non/2	
Tenordate	Gélule		prise à distance des repas		3non/3	
Tenoretic 50mg/12,5mg	Comprimé pelliculé sécable				1 non/1 + labo	La galénique du cp n'a pas de caractéristiques particulières qui s'opposerait à l'écrasement mais il n'y a pas de données.
Tenormine 50mg et 100mg	Comprimé pelliculé sécable		Administrer le matin de préférence.	-	5oui/5	
Tenstaten 50mg	Gélule		-	-	3oui/3	
Teralithe 250mg	Comprimé sécable		A administrer au cours ou en fin de repas	-	5 oui/5 + labo	Aucune étude réalisée avec les cp écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Le cp sécable 250mg est un cp nu à libération immédiate.
Teralithe LP 400 mg	Comprimé sécable à libération prolongée		Ne pas croquer A administrer au cours ou en fin de repas	Teralithe 250mg	4 non/5 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // Le cp sécable à 400mg est à LP

Tercian 25 et 100mg	Comprimé pelliculé sécable			Tercian 40mg/ml, sol buv, fl. de 30ml	5 non/8 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinetiques et pharmacodynamiques // Il n'y a pas lieu d'écraser les cps car il existe une alternative par une solution buvable a 40mg/ml
Thalidomide 50mg	Gélule		Produit cytotoxique	-	1non/1	pas d'info labo mais impossible car PA cytotoxique
Theophylline LP 50mg et 400mg	Gélule LP		Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé à un aliment liquide ou semi-liquide en veillant à ce que les microgranules ne soit pas croqués.	Ne pas écraser le contenu: forme à LP	1oui/1	
Théostat	Comprimé sécable à libération prolongée		Ne pas écraser. Ne pas croquer.		3non/3	
Theralene	Comprimé pelliculé sécable			Theralène 0,05% sirop ou Theralène 4% solution buvable en gouttes	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par Théralène sirop ou solution buvable en gouttes
Tiapridal 100mg	Comprimé sécable		A administrer avant le repas	Tiapridal 5mg/goutte, solu buv en goutte, fl. de 30ml	10 oui/10+labo	Pas de raison d'écraser les cp car existe la solution buvable 5 mg/goutte // aucune étude sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinetiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // le PA est soluble dans l'eau et cp nus
Tibéral 500mg	Comprimé		-	Flagyl oral 4% susp buvable	1 non/2 + labo	non
Ticlid 250mg	Comprimé pelliculé		administration immédiate car photosensible	-	4oui/4	
Tilcotil 20mg	Comprimé pelliculé sécable		D'après RCP "les cps sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau".	-	1 oui/1	Compte tenu de la sensibilité du tenoxicam à l'oxydation, le labo ne peut que déconseiller le broyage des comprimés.
Tildiem 60mg	Comprimé		Ne pas croquer	autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium	7non/7	
Tinset 30mg	Comprimé sécable		-	Tinset 2,5mg/ml, susp buv, fl. de 90ml ou autre antihistaminique	2 non/2+labo	Aucune donnée donc non recommandé mais disponible en suspension buvable
Tiorfan 100mg	Gélule		goût désagréable, prise avant le repas	-	5oui/5	
Tofranil 10 et 25mg	Comprimé enrobé		-	-	1 oui/1 + labo	Aucune étude clinique n'a été menée sur l'utilisation de ces médicaments une fois les comprimés écrasés et aucune donnée à ce sujet dans l'AMM, Donc pas de garantie sur la qualité et l'efficacité de cette spécialité lors d'une telle utilisation
Topalgic 50mg	Gélule		dilution dans un yaourt	Topalgic 100mg/ml, sol buv, fl. de 10ml ou utilisation de Tramadol 50mg cpr effervescent	4 oui/6 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinetiques et sur la tolérance // D'un point de vue galénique il est possible d'ouvrir les gélules et de dissoudre le contenu dans une solution aqueuse car le tramadol est hydrosoluble // chez les patients sondés l'utilisation des formes liquides doit toujours être préférée // Attention si sonde duodeno jejunale car le PA est absorbé au niveau de la partie haute du jejunum (risque de diminution de l'absorption)
Topalgic LP 100mg, 150mg et 200mg	Comprimé à libération prolongée		-	Topalgic 100mg/ml, sol buv, fl. de 10ml	6non/6	pas d'info labo mais impossible car forme LP
Torental LP 400 mg	Comprimé à libération prolongée				4non/4	pas d'info labo mais impossible car forme LP

Tracleer 65,5mg et 125mg	Comprimé pelliculé		-	Tracleer 32mg forme dispersible, cp quadriséable	1 oui/1 +labo	Si les comprimés de Tracleer ne peuvent être avalés, ils peuvent être administrés sous forme d'une suspension liquide préparée extemporanément. Les comprimés de Tracleer se dispersent rapidement (en moins de 5 min) dans des liquides tels que l'eau, mais le produit reste en suspension au lieu de former une véritable solution. Il n'est pas nécessaire d'écraser les comprimés au préalable. La suspension doit être préparée immédiatement avant l'administration, car le produit n'est pas stable en suspension. NB : Il existe une forme dispersible : TRACLEER 32mg
Trandate 200mg	Comprimé pelliculé sécable		prise en fin de repas	-	7/7 + labo	Il existe une étude qui a montré la stabilité des comprimés écrasés dissous dans les liquides suivant: eau, jus de fruit (pomme orange, raisin), lorsque la solution est conservée dans des flacons teintés à température ambiante et à 4°C. Cependant le PA étant photosensible, cette étude ne permet pas à elle seule de garantir l'efficacité du produit après modification de sa forme et notamment après la rupture de son pelliculage.
Tranxene 5mg, 10mg et 20mg	Gélule		Photosensible	Préférer Lysanxia sol buvable (sauf indic Tétanos)	3 non/9+labo	Aucune donnée sur les gélules ouvertes donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // le PA est sensible à la lumière et à l'humidité de ce fait les gélules sont opaques et fermées de façon spécifique
Trasicor 80mg	Comprimé pelliculé sécable		-	-	1 oui/1 +labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable.
Trasicor LP 160mg	Comprimé pelliculé sécable		-	Trasicor 80mg, comprimé sécable	1/1 +labo	Impossible de les écraser car la forme galénique ne le permet pas : LP
Trasitensine	Comprimé enrobé				labo	Non, compte tenu de la présence de composés acryliques (matrice) nécessaires à la cinétique du médicament.
Tredemine 500 mg	Comprimé à croquer				2 oui/3 + labo	oui il est possible de les écraser // D'après le RCP: " les cps doivent être mastiqués longuement et complètement puis avalés avec très peu d'eau afin que le médicament arrive au niveau de l'estomac sous forme pulvérulente. Pour les enfants de moins de 6 ans écraser préalablement les cps
Trentadil 300mg	Comprimé enrobé		Goût amer. D'après le RCP "le cp sera avalé sans être croqué"	Euphylline oral, forme suppo	1 oui/2 + labo	Possible car cp à libération immédiate // cp enrobé car PA très amer l'observance du traitement peut donc être altérée
Triatec 1.25, 2.5, 5 et 10mg	Comprimé sécable pour les dosages 2,5 - 5 et 10 mg		D'après le RCP "Triatec doit être avalé avec du liquide. Il ne doit être ni mâché, ni écrasé".	Autres IEC : Enalapril, Coversyl, Cibacène, Lisinopril	6 oui/6+labo	Au niveau galénique le cp n'est pas gastroresistant ni retard. Cependant aucune donnée sur les cps écrasés ou broyés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // le labo ne le recommande pas // pour les SNG le labo ne le recommande pas car aucune étude n'a été faite // procédure hors AMM.
Triflucan 50mg, 100 mg	Gélule			TRIFLUCAN forme buvable 50mg/5ml ou 200mg/5ml, flacon de 35ml	6oui/6	
Trileptal 300mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	Trileptal 60mg/ml, susp buv, fl. de 250ml	7 non/8 + labo	Alternative par une suspension buvable donc pas d'études réalisées même si l'écrasement est possible sur le plan galénique // risque de perte de PA
Trinitrine 0,15mg	pilule enrobée		Voie sublinguale. Croquer lentement la pilule enrobée et la garder quelque temps dans la bouche.		1 non/1	
Trivastal 20mg	Comprimé enrobé		D'après RCP "les cps sont à avaler avec un demi-verre d'eau, sans les croquer, en fin de repas".	-	4 oui/6 + labo	Ecrasement possible car forme non LP
Trivastal LP 50mg	Comprimé enrobé		Ne pas croquer	Trivastal 20mg, alternative : Fonzylane comprimé, prise en fin de repas	8non/8 + labo	Forme LP donc risque d'accélérer la cinétique et d'exercer un effet pharmacodynamique excessif

RCP du 01/08/2011

RCP du 13/07/2010 et infos labo actualisées en oct 2011

RCP du 11/04/2008

Trizivir 300mg, 150mg	Comprimé pelliculé			Ziagen 20mg/ml, sol buv, fl. de 240ml + Epivir 10mg/ml, sol buv, fl. de 240ml + Retrovir 100mg/ml, sol buv, fl. de 200ml	2non/2	
Trolovol 300mg	Comprimé pelliculé		A distance des repas	-	2oui/2	
Truvada 200mg/245mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Le cp Truvada peut être délité dans 100ml d'eau, de jus d'orange ou de raisin et administré immédiatement après.	-	2non/2	
Ubiten 50mg	Gélule			UBITEN 50mg/10 ml solution buvable, flacon	1 oui/1	pas d'info labo mais alternative possible par une forme buvable
UFT 100mg/224mg	Gélule		Ne pas ouvrir, PA cytotoxique		1non/1	pas d'info labo mais impossible car produit cytotoxique
Ultralevure 50 et 200mg	Gélule		contre-indiqué si présence d'un cathéter central (dispersion spores), goût amer et mauvaise odeur	ULTRA-LEVURE Poudre pour suspension buvable : Sachets, boîte de 20.	1 oui/1	pas d'info labo mais il existe une alternative par une suspension buvable
Un -alfa 0,25mg, 0,5mg et 1µg	Capsule molle		Ne pas croquer, ne pas écraser	UN-ALFA sol buv en goutte fl 10ml	5non/5	
Urbanyl 5 mg	Gélule				1 non/2 + labo	Pas d'étude. La gélule peut être ouverte d'un point de vue galénique. Le clobazam est peu soluble dans l'eau.
Urbanyl 10mg, 20mg	Comprimé (sécable pour le 10mg)		-	-	5 non/9 + labo	Aucune donnée sur les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques mais aussi sur la tolérance // au niveau galénique le cp est nu et le PA est peu soluble dans l'eau
Uromitexan 400mg, 600mg	Comprimé pelliculé sécable		-	Les ampoules pour la voie injectable peuvent être avalées.	2 oui/3 + labo	Aucune étude n'a été faite. L'écrasement des comprimés en vue de leur utilisation par SNG est couramment fait.
Ursolvan 200mg	Gélule		-	-	1 oui/2 + labo	Aucune étude réalisée avec les cps écrasés donc pas de garantie sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques // D'un point de vue galénique il est possible de les ouvrir // Le PA est peu soluble dans l'eau
Utrogestan 100 mg	Capsule molle		prise à distance des repas		3non/3 + labo	non, Renferme une suspension en phase huileuse
Vadilex 20mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	Autre anti-ischémique: Sermion lycoc etc...	2non/2	
Valdoxan 25 mg	Comprimé pelliculé				labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Valium 2mg, 5mg et 10mg	Comprimé sécable		-	Valium 1%, sol buv en gouttes, fl. de 20ml	3 oui/8 + labo	Aucune étude car alternative par une solution buvable
Vastarel 20mg	Comprimé pelliculé		prise pendant les repas	VASTAREL solution buvable à 20mg/ml flacon de 60ml, prise pendant les repas	2 oui/3 + labo	Ecrasement possible car forme non LP // Alternative possible par une solution buvable à 20mg
Vastarel LP 35mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer	Vastarel 20mg/ml, sol buv, fl. de 60ml	10non/10 + labo	impossible car forme LP
Vasten 10, 20 et 40mg	Comprimé sécable		Administration immédiate		3 oui/3	
Vectarion 50mg	Comprimé pelliculé sécable		-	-	6 oui/6 + labo	Peut être administré en suspension après broyage, la cinétique sera peu modifiée
Vepeside 50mg	Capsule molle		A administrer avant ou pendant le repas, Produit cytotoxique	-	2non/2	
Vfend 50mg et 200mg	Comprimé pelliculé		Administration extemporanée	Vfend 40mg/ml, sol buv, fl. de 70ml	2 oui/4+labo	Absence de données pharmacocinétiques et pas d'AMM donc non recommandé par le labo. Mais existe quelques études pharmacocinétiques qui montrent une bioéquivalence entre l'administration de cps écrasés et entiers // vfend IV pas d'info pour administration par voie orale
Vibramycine	Comprimé sécable		Prise pendant les repas, Ne pas s'allonger dans les 30 min suivant la prise. Ne pas administrer en même temps qu'un aliment lacté. Dissoudre le cp dans l'eau		2oui/2 + labo	D'après le RCP: "Délayés dans un demi-verre d'eau. Dans ce cas, et afin d'avaler tout ce médicament, il est recommandé de bien agiter après dispersion des comprimés dans l'eau. La couleur jaune est normale, c'est celle du principe actif"
Videx 25, 50, 100 et 150 mg	Comprimé à croquer, à mâcher ou à mettre en suspension		Dissoudre le comprimé dans l'eau		1oui/1 + labo	A croquer ou dispersible// dispersion dans au moins 30 ml d'eau. Peut être diluée dans du jus de pomme pour plus d'arôme

Videx 125, 200, 250mg et 400mg	Gélule gastro résistante		A jeun. Ne pas croquer.	Videx 2g, poudre pour sol buv	3 non/5+labo	Ne pas ouvrir la gélule pour faciliter l'administration car la stabilité des granules gastro-résistants hors de la gélule n'a pas été étudiée
Viracept 250mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer.	Viracept 144g, poudre orale	3non/3	
Viramune 200mg	Comprimé		Ne pas croquer.	Viramune 50mg/5ml, susp buv, fl. de 240ml	3non/3	
Viread 245mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer.	-	2non/2	
Visceralgine 50mg	Comprimé pelliculé		-	spasfon lycoc ou debridat sol buvable	2 oui/2	
Visken 5mg	Comprimé		Ne pas croquer	-	2oui/2 + labo	Aucune donnée // ce n'est pas une forme LP ni gastro-résistante // risque de perte de PA au moment du broyage// le cp broyé est à adm sur un aliment semi-solide et surtout ne pas dissoudre au préalable.
Vitamine B1 B6	Comprimé pelliculé		Comprimé très amer et odeur désagréable		9 oui/10 + labo	aucune donnée mais PA sensible à la lumière
Vitamine B12 1000µg	Comprimé pelliculé			Vitamine B12 1mg/2ml, sol buv, amp. de 1 et 2ml	3 oui/4 + labo	aucune donnée mais PA sensible à la lumière
Vitamine B12 - 250µg	Comprimé sécable		-	Vitamine B12 1mg/2ml, sol buv, amp. de 1 et 2ml	1oui/1 + labo	Pas d'étude sur cps écrasés //PA photosensible mais cp peut être écrasé //pas d'enrobage
Vogalène 15mg	Gélule		D'après RCP "ne pas les ouvrir"	Vogalene 0,1%, sol buv, fl. de 150ml	labo	Aucune étude sur la possibilité d'ouvrir les gel // Alternative par d'autres formes disponibles tels que la solution buvable ou le lycoc
Vogalene lycoc 7,5mg	Lyophilisat oral		dispersible dans l'eau et dans la bouche. Ne pas croquer.			
Voltarene 25mg, 50mg, 100mg	Comprimé gastro-résistant		Ne pas croquer. A administrer au cours du repas	Voltarene 100mg, suppositoire Autre AINS: Apranax sachet, Feldene 20mg etc...	7non/7	
Xanax 0,25mg, 0,50mg	Comprimé sécable				4oui/4	
Xatral 2,5mg	Comprimé pelliculé				5 oui/7 + labo	Les cps sont à libération immédiate mais déconseillé de les écraser car pelliculage opaque qui permet de protéger le PA de la lumière et de masquer son amertume,
Xatral LP 10mg	Comprimé à libération prolongée		Ne pas croquer, Ne pas macher. Administrer après un repas.	Xatral 2,5 mg	10non/10 + labo	D'après le RCP,pour les cps à 10mg LP il ne doivent pas être croqués, machés, écrasés ou broyés car il y a un risque de libération et d'absorption inappropriée et donc des EI pouvant être précoces. Ne pas utiliser cette forme galénique pour un passage en sonde // Si l'usage d'une sonde est indispensable préférer le cp à 2,5mg // Bioéquivalence entre 1 cp 10mg LP et 1cp de 2,5mg 3*/jours
Xeloda 150mg et 500mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Produit cytotoxique	-	1 non/2 + labo	Appeler au cas par cas
Xyzall 5mg	Comprimé pelliculé		A administrer extemporanément		1/1 + labo	Les comprimés sont à libération immédiate et peuvent être écrasés et administrés extemporanément,
Zacnan 50mg, 100 mg	Gélule				2oui/2	
Zaditen LP 2mg	Comprimé pelliculé à libération prolongée			Zaditen 1mg/5ml, sol buv, fl. de 150 ml		pas d'info labo mais alternative possible par Zaditen solution buvable
Zaditen 1mg	Gélule		-	Zaditen 1mg/5ml, sol buv, fl. de 150 ml	2 oui/3	pas d'info labo mais alternative possible par Zaditen solution buvable
Zamudol LP 50, 100, 150 et 200mg	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser les microgranules	Orozamudol 50mg cp orodispersible	1 oui/1 + labo	D'après le RCP : Il est possible d'ouvrir les gélules, avec précaution, et de verser les granules dans une cuillère. Après avoir mis la cuillères et les granules dans la bouche, le patient absorbera un verre d'eau afin de rincer la bouche de tous les granules résiduels. Les granules ne doivent être ni croqués, ni écrasés.
Zeclar 250 mg et 500 mg	Comprimé pelliculé		-	Zeclar 25mg/ml, granulés pr susp buv, fl. de 100ml	4 oui/6+labo	Aucune donnée sur efficacité et sécurité des produits écrasés
Zeffix 100mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer.	Zeffix 5mg sol buv fl 240ml	2 non/3 + labo	Pas de données concernant l'écrasement des comprimés, Cette utilisation est donc non recommandée, Existe sous forme de solution buvable,

Zelitrex 500mg	Comprimé enrobé		-	Zovirax sol buvable	4 non/7+labo	Une publication sur la pharmacocinétique des cp écrasés chez les enfants mais petit nombre de patient et pas d'AMM chez l'enfant: la biodisponibilité du valaciclovir était globalement de 45%: étude ne permettant pas de conclure
Zentel 400mg	Comprimé			Zentel suspension buvable à 400 mg/10 ml : Flacon de 10 ml	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par une suspension buvable
Zerit 40mg	Gélule		-	Forme buvable,	2 oui/4 + labo	Dans l'AMM // mélange possible avec les aliments
Zestoretic 20 mg/12,5 mg (lisinopril + hydrochlorothiazide)	Comprimé sécable				1 oui/1 + labo	Impossible de garantir la pharmacocinétique car aucune étude // possible mais non recommandé // cp très difficile à écraser // s'assurer que le PA et l'excipient forment bien un mélange homogène, que le patient a pris la totalité du produit // goût désagréable
Zestril 5mg, 20mg	Comprimé sécable		Administrer à heure fixe.		4oui/4	
Ziagen 300mg	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer.	Ziagen 20mg/ml, sol buv, fl. de 240ml	3non/3	
Zinnat 125, 250 et 500mg	Comprimé pelliculé		D'après le RCP "les cps doivent être avalés sans les croquer avec un verre d'eau".	ZINNAT 125mg/5ml solution buvable	labo	Déconseillé car son PA est amer, de plus une libération spécifique de celui-ci a été obtenue suite au développement galénique. Alternative zinnat 125 mg granulés pour suspension buvable en sachets ou en flacon
Zithromax 250mg	Comprimé pelliculé		PA photosensible	Zithromax 40mg/ml, poudre pour susp buv, fl. de 30ml	4 non/5 + labo	Aucune étude n'a été menée donc le labo ne le recommande pas // dans la littérature scientifique 1 seule référence : possibilité d'écraser pour administration par sonde// alternative par une solution buvable
Zocor 5, 20 et 40mg	Comprimé enrobé (sécable pour le 20mg)		Ne pas croquer. Administrer le soir au cours du repas.	Autre Statine: Elisor comp, Tahor 10 mg ou 40 mg etc...	3 non/4 + labo	Pas d'étude
Zoloft 50 mg	Gélule		Prise pendant les repas	Autre antidépresseur sérotoninergique: Prozac 20 mg, Deroxat 20 mg etc...	7 non/8 + labo	Les gélules ne sont pas GR // mais en l'absence de données pas recommandé
Zomig	Comprimé pelliculé			Zomigoro comprimé orodispersible	1 non/1	pas d'info labo mais alternative possible par une forme orodispersible
Zomigoro 2,5mg	Comprimé orodispersible		Laisser fondre dans la bouche	-	3oui/3	
Zophren 4mg et 8mg	Comprimé pelliculé		-	Zophren 4 mg/5 mL, sirop, fl. de 50 ml	2 non/3 + labo	Pas de données cliniques ou pharmacocinétique. Briser le cp exposerait le PA et pourrait rendre le produit amer.
Zophren 4mg et 8mg	Lyophilisat oral		Laisser fondre dans la bouche	Zophren 4 mg/5 mL, sirop, fl. de 50 ml	5oui/5	
Zovirax 200 et 800 mg	Comprimé			Solution buvable	3non/3 + labo	Interdit d'écraser, Existe une forme de suspension buvable pour adulte et enfant (dosage à 200 mg)
Zyloric 100, 200 et 300mg	Comprimé		Administrer après le repas		7 oui/8 + labo	Les cps sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après les repas. Cependant leur écrasement est possible en cas de besoin (produit à lib immédiate, sans pelliculage, ni amer, ni photosensible). L'allopurinol est sensible à l'humidité. Le broyat ne peut donc être conservé plus de 24h avant utilisation. La meilleure façon de procéder est de broyer le cp peu de temps avant chaque prise.
Zyrtecset 10mg	Comprimé pelliculé sécable			ZYRTEC solution buvable 10mg/ml		pas d'info labo mais alternative possible par une solution buvable
Zyprexa 5mg, 7,5mg, 10mg	Comprimé enrobé		Ne pas croquer	Zyprexa velotab 5mg et 10mg, comprimés orodispersibles	6non/6	
Zyvoxid 600mg	Comprimé pelliculé		-	Zyvoxid 100mg/5ml, granulés pr susp buv, fl. de 240ml	3non/3	