



**Antiseptiques :
Indications, Péremptions, Précautions d'Emploi**

PRODUITS	SPECIALITES	INDICATIONS <i>PEREMPTION APRES OUVERTURE</i>	PRECAUTIONS ET CONTRE-INDICATIONS D'EMPLOI
LES ANTISEPTIQUES MAJEURS			
DERIVES IODES	Solution moussante Bétadine® Scrub 4%	Lavage antiseptique et chirurgical des mains DéterSION et antiseptie peau et muqueuses saines ou lésées <i>→ 15 jours</i>	<p><u>Précautions d'emploi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chez l'enfant de 1 à 30 mois, bien rincer après application. - Pas d'association avec d'autres antiseptiques - Bétadine® alcoolique : s'assurer du séchage complet <p><u>Contre-indication :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chez le nouveau-né de 0 à 1 mois - Antécédent d'allergie à la povidone (les intolérances aux produits de contraste iodé et aux fruits de mer ne constituent pas une contre-indication à la povidone) - Chez les brûlés (> 10%) - Grossesse (2ème et 3ème trimestre) et allaitement. - Muqueuses chez l'enfant de moins de 5 ans - Dysfonctionnement thyroïdien.
	Solution alcoolique Bétadine® alcoolique 5%	Antiseptie de la peau saine Antiseptie du champ préopératoire <i>→ 15 jours</i>	
	Solution aqueuse Bétadine® Dermique 10%	Antiseptie plaies et brûlures superficielles et peu étendues Traitement des affections de la peau et des muqueuses <i>→ 15 jours</i>	
	Solution aqueuse Bétadine® gynécologique 10%	PURE : antiseptie vaginale et périnéale DILUÉE : irrigation vaginale (2 cuillères à soupe/litre d'eau tiède) <i>→ 15 jours</i>	
	Bétadine® tulle 10%	Traitement d'ulcères profonds, de plaies chirurgicales, de brûlures superficielles <i>→ utilisation extemporanée</i>	

PRODUITS	SPECIALITES	INDICATIONS <i>PEREMPTION APRES OUVERTURE</i>	PRECAUTIONS ET CONTRE-INDICATIONS D'EMPLOI
	Bétadine® gel 10%	Antiseptie des plaies et brûlures superficielles et peu étendues Traitement des affections de la peau et des muqueuses <i>→ 15 jours</i>	Ne pas utiliser chez le nouveau-né et l'enfant de moins de 6 ans (menthol)
	Bétadine® bains de bouche 10%	Traitement des affections buccales et de l'oropharynx <i>→ utilisation extemporanée</i>	
CHLORHEXIDINE	Solution moussante Hibiscrub® 4%	Lavage antiseptique et chirurgical des mains Détersion et antiseptie peau saine <i>→ 15 jours</i>	Risques d'effets systémiques si applications étendues ou en pansements occlusifs - Rares cas d'eczéma allergique - Pas de contact avec les muqueuses - Pas d'utilisation dans les cavités internes - Pas de contact avec le cerveau, les méninges, ni avec le conduit auditif en cas de perforation tympanique
	Solution aqueuse Hibidil® 0,05%	Indications très limitées car très diluée (antiseptie des plaies et des brûlures) <i>→ utilisation extemporanée</i>	
DERIVES CHLORES	Dakin COOPER® stabilisé (1,5° chlorométrique)	Antiseptie de la peau et des muqueuses saines ou lésées Conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang <i>→ 15 jours</i>	Bonne tolérance : rares cas de sensation de brûlures ou d'irritation notamment sur peau lésée Incompatibilité avec les matières organiques : ne pas utiliser sur plaie souillée de sang et de pus
	Amukine® (0,2° chlorométrique)	Antiseptie de la peau et des muqueuses saines ou lésées <i>→ 15 jours</i>	
ALCOOLS	Alcool modifié 70% GILBERT (contient du camphre)	Antiseptie de la peau saine avant prélèvement ou injection Pansement alcoolique <i>→ 15 jours</i>	Ne pas utiliser : - chez l'enfant de moins de 30 mois ou ayant des antécédents de convulsions - sur les muqueuses ni sur les plaies - lors des prélèvements d'alcoolémie - en cas d'hypersensibilité au colorant tartrazine (croisée avec allergie à l'aspirine)



Antiseptiques : Indications, Péremptions, Précautions d'Emploi

PRODUITS	SPECIALITES	INDICATIONS <i>PEREMPTION APRES OUVERTURE</i>	PRECAUTIONS ET CONTRE-INDICATIONS D'EMPLOI
LES ASSOCIATIONS D'ANTISEPTIQUES			
Chlorhexidine + Chlorure de Benzalkonium + Alcool Benzylrique	Biseptine®	Antiseptie de la peau saine ou lésée Antiseptie du champ préopératoire Traitement des affections de la peau <i>→ 15 jours</i>	- Risques d'effets systémiques si applications étendues ou en pansements occlusifs - Rares cas d'eczéma allergique
Chlorhexidine + Hexamidine + Chlorocrésol	Cytéal®	Détersion et antiseptie des muqueuses (gynécologie) et de la peau (dermatologie) <i>→ 15 jours</i>	- Pas de contact avec les muqueuses (Biseptine®) - Pas d'utilisation dans les cavités internes - Pas de contact avec le cerveau, les méninges, l'œil, ni avec le conduit auditif en cas de perforation tympanique
PRODUITS CONSIDERES A TORT COMME ANTISEPTIQUES			
PEROXYDE D'HYDROGENE	Eau oxygénée Gilbert	Action hémostatique et détergente <i>→ 8 jours</i>	Pas d'application oculaire Ne pas utiliser si hypersensibilité aux salicylés et aux peroxydes
Les colorants	Éosine aqueuse à 2% Gifrer	Action desséchante (érythème fessier) <i>→ utilisation extemporanée</i>	